













402  
831  
C99  
1850  
t. 3  
RB  
SI

# MYOLOGIE DU PHOQUE COMMUN

(PHOCA VITULINA L., Cuv., Règ. an., t. I, p. 167.)

Planches 169 à 173, dessinées par M. LAURILLARD.

Les phoques sont, comme on sait, des animaux carnivores à corps allongé, à bassin étroit, à extrémités courtes et aplaties en forme de rames, qui nagent avec beaucoup d'agilité et de célérité, mais qui rampent sur terre, plutôt qu'ils n'y marchent, à l'aide de leurs extrémités antérieures seules et par une suite de bonds opérés par la flexion dans le sens vertical et le redressement de la colonne vertébrale. Aussi ces animaux passent-ils la plus grande partie de leur vie dans la mer, où ils poursuivent les poissons qui leur servent de nourriture, et ne viennent-ils à terre que pour se reposer au soleil et y allaiter leurs petits.

La première remarque à faire, c'est celle de l'étendue et de la force du peaucier. La tête et le tronc de l'animal semblent être logés dans un étui de fibres musculaires ouvert seulement sous la poitrine et le ventre, pl. 169, 170, fig. 1 et 2. Aussi il est à présumer que ce muscle agit fortement dans les violents efforts du tronc qu'exige la progression saccadée du phoque sur la terre.

Une seconde remarque, c'est que les apophyses épineuses des vertèbres sont courtes, que les cartilages intervertébraux sont épais, et que les muscles de l'épine sont très distincts les uns des autres, à peu près comme dans les fœtus des autres mammifères, dispositions qui donnent une grande souplesse à la colonne vertébrale, en laissant agir les muscles indépendamment les uns des autres. Le releveur des côtes [9], pl. 172, 173, fig. 2, est très fort et s'étend de la deuxième côte à la dernière; il est ici presque aussi développé que chez les serpents.

Tous les muscles qui meuvent l'épaule et le bras sont forts. Le grand dorsal [i], pl. 171, fig. 1, s'attache en arrière jusqu'à la dernière côte, et il s'avance tellement en avant qu'il recouvre l'angle postérieur de l'omoplate comme pour maintenir cet os accolé contre le tronc. Il donne deux tendons : l'un, antérieur, s'unit au grand rond [o], fig. 3, et l'autre, postérieur, se joint au grand pectoral et au peaucier [j et 5<sup>b</sup>].

Le grand pectoral [j], pl. 160, 170, fig. 2, non divisé en plusieurs faisceaux, s'avance jusque sous le cou, au delà de l'appendice xyphoïde, en s'unissant dans ce prolongement à celui du côté opposé. Ses fibres externes se terminent en une aponévrose qui recouvre les os du carpe, de sorte que ce muscle agit directement sur la main, qui acquiert par là une plus grande force pour frapper l'eau.

Le grand oblique [13], pl. 169, 170, fig. 2, et 171, fig. 1, est également très fort, surtout en arrière. Son dernier faisceau [13<sup>a</sup>] passe sur la cuisse et le genou, recouvre une partie de la face interne de la jambe, et va se fixer au pubis avec le grêle interne; disposition qui doit donner à ce muscle une grande part dans la flexion du bassin sur le tronc, et qui sert en même temps à empêcher le genou de s'écarter.



Les muscles de l'extrémité postérieure offrent quelques particularités qui tiennent à la disposition de la jambe et du pied sur une ligne droite parallèle à l'axe du corps, à la petitesse des os iléons, à l'allongement des ischions et des pubis, au peu de longueur de la cuisse et au peu de liberté de mouvement dont elle jouit.

Le grand fessier [a], pl. 171, fig. 1 et 2, par son insertion au sacrum et aux premières vertèbres de la queue, est un véritable fléchisseur de la cuisse. Le fascia-lata [x], *ibid.*, se porte à la rotule et se trouve accolé au couturier. Le droit antérieur [p], pl. 171, 173, fig. 1, s'insère à l'épine et à la crête de l'os des iles, comme dans l'homme, tandis que, dans tous les autres carnivores, il s'insère à son col. Les vastes et le crural sont peu distincts les uns des autres. Le grand psoas [h], pl. 169, 170, fig. 5, se termine à la crête inférieure de l'os des iles, et ne donne point de tendon au fémur, de sorte qu'il ne sert qu'à fléchir le bassin sur les lombes. L'iliaque [i] est petit, et ses fibres s'implantent sur presque toute la longueur du fémur. Les pectinés [k] n'existent qu'en rudiments. Le muscle marqué du signe [l], qui désigne un adducteur, n'est peut-être que l'obturateur interne, puisque son tendon se confond avec celui de l'obturateur externe [d] : dans ce cas, il n'y aurait point d'adducteur.

Le grêle interne [u] est un muscle très épais qui sert puissamment à rapprocher la jambe de la ligne moyenne. Le demi-nerveux [r] ne s'insère point au bassin, mais aux premières vertèbres caudales; ses fibres postérieures, ainsi que celles du grêle interne [u], s'épanouissent sur un prolongement du tendon malléolaire qui donne une languette au pouce et une autre pour les quatrième et cinquième doigts, et constituent ainsi un accessoire du plantaire grêle. Ces deux derniers muscles, à savoir le grêle interne et le demi-nerveux, se fixent à la moitié inférieure du tibia; ils ont par conséquent, pour frapper l'eau, une force d'autant plus grande qu'ils sont très épais. Les extenseurs des doigts n'offrent rien de particulier, et les fléchisseurs ne se font remarquer que par la force du tendon du fléchisseur commun [x].

Le biceps [q] et son accessoire [q'], pl. 171, fig. 2, forment un muscle triangulaire dont la totalité des fibres s'épanouit en éventail sur toute l'étendue du péroné. Ce muscle doit avoir une grande force, puisque son point fixe est placé au centre de toutes les fibres rayonnantes.

Telles sont les principales remarques à faire sur les muscles des phoques, disposés, nous le répétons, de manière à donner au tronc la souplesse nécessaire pour le genre de reptation de l'animal sur le sol, et de manière à transformer les extrémités antérieures et postérieures en organes de natation, en ne faisant subir à ces muscles que de simples modifications dans leurs attaches, comme parfois quelque augmentation dans leur force, et parfois aussi des réductions dans ceux dont l'action n'était plus nécessaire pour ce genre de mouvement.

---




Voyez, pour une explication plus détaillée des muscles du phoque, les *Recherches anatomiques sur les organes du mouvement du phoque commun*, par M. Duvernoy, *Mémoires du Muséum*, tome IX.















# PHOQUE COMMUN.

Fig. 1.  
Face latérale  
1<sup>re</sup> couche.





Fig. 2.

Face ext des muscles  
de la cuisse.



13

Fig. 3.

Face interne des  
muscles de la cuisse.













# PHOQUE COMMUN.

Pl. 172 et 173.





# MYOLOGIE DU SARIGUE CRABIER

(DIDELPHIS CANCRIVORA ET DID. MARSUPIALIS L., CUV., *Règ. an.*, tome I, p. 176.)

Planches 174 à 176, dessinées par M. CUVIER.

Les sarigues forment la première subdivision des *marsupiaux* ou *animaux à bourses*, dont M. Cuvier formait un ordre, le quatrième des mammifères, mais dont plusieurs naturalistes forment une classe en tranchant la question dans le sens que M. Cuvier avait lui-même indiqué.

Ces animaux sont ainsi nommés parce que la peau de l'arrière de leur abdomen est presque toujours disposée en forme de poche ou de bourse enveloppant les mamelles, et dans laquelle sont préservés, comme dans une seconde matrice, les petits, qui naissent dans un état de développement très imparfait, et qui s'attachent d'une manière fixe aux mamelles jusqu'à ce qu'ils soient en état de marcher. Ils ont au bassin deux os surnuméraires attachés au pubis et interposés dans les muscles de l'abdomen : ces os, que l'on a nommés *os marsupiaux*, existent même dans les mâles et dans les espèces où il n'y a pas de poche<sup>1</sup>.

Les muscles des sarigues sont peu différents de ceux des autres carnassiers; cependant ils offrent quelques particularités. Ainsi, de la portion occipitale du trapèze [a], pl. 174 et 176, fig. 1, qui se fixe à la clavicule, se détachent deux faisceaux [+ a] dont l'un se fixe à cette même clavicule, mais plus en dedans, et l'autre sur le sternum avec le sterno-mastoïdien [b], dont il semble n'être qu'un accessoire. Dans ses notes marginales, M. Cuvier dit : « Il existe un muscle particulier allant de la portion moyenne de l'omoplate à la clavicule, où il s'insère derrière la deuxième portion claviculaire du trapèze. » [Nous l'avons marqué de la lettre h', pl. 175, fig. 3 et 4, et 176, fig. 1.] On pourra l'appeler *sus-clavier* ou *scapulo-claviculaire*.

M. Cuvier dit encore : « Le long supinateur s'attache au carpe<sup>2</sup>; il y en a un court marqué en points, sous les radiaux et l'extenseur commun. L'extenseur du pouce donne un tendon à l'index, et l'extenseur du petit doigt en donne aussi un à l'annulaire.

« Le grand fessier s'étend très bas; il donne de son bord postérieur un faisceau [r', pl. 175, fig. 5, et pl. 176, fig. 3] qui s'unit au milieu du bord inférieur du biceps et du demi-nerveux, et se partage ensuite pour accompagner le bord inférieur de l'un et de l'autre, jusqu'aux deux faces latérales de la jambe. De sa face interne, le grand fessier donne un autre ruban marqué en points [pl. 176, fig. 3], et qui se colle à la face interne du biceps; le premier est l'accessoire du demi-nerveux, le second du biceps. »

(1) Il a été cependant reconnu dans ces derniers temps que le thylacine (*Did. cynocephala*, Larrio), le plus grand des didelphes carnassiers connus, ne porte que des rudiments d'os marsupiaux, consistant en deux petits et minces cartilages fixés également au pubis.

(2) Ce muscle, d'après ses attaches ordinaires, est nommé *huméro-susradien*; ici, il est *huméro-suscarpien*; ce qui prouve, comme nous aurions déjà pu le remarquer et comme nous le remarquerons encore plus tard, que les noms des muscles pris de leurs attaches ne doivent point être employés en anatomie comparée, puisque ces attaches varient dans beaucoup d'espèces.



M. Cuvier continue, et dit : « Il y a un petit péronier pour chacun des doigts qui suivent le pouce; le pédieux ne donne qu'au pouce.

« Les lombricaux, ou fléchisseurs perforés, naissent tous du tendon du perforant; les deux des doigts moyens, assez haut sur la jambe<sup>1</sup>. La chair carrée [o] passe entre eux et le perforant, pour former en grande partie le tendon du pouce. Le long fléchisseur du pouce s'unit au bord interne du fléchisseur commun perforant; de lui naît principalement le perforé de l'index.

« Les dentelés antérieurs et postérieurs sont très charnus d'un bout à l'autre. Le sacro-lombaire a deux languettes cervicales. Le long dorsal cinq; le transversaire n'existe qu'en vestige, derrière les tendons du long dorsal. Le petit complexus se termine à la troisième côte, le grand à la deuxième, et le digastrique à la sixième. » (Voyez pl. 175, fig. 1 et 2.)

Les sarigues ont le pouce du pied de derrière opposable aux autres doigts, comme chez les quadrumanes; aussi on peut remarquer [pl. 174, et 176, fig. 5] que les adducteurs obliques et transverses du pouce [v et v'] sont très forts.

La pl. 176, fig. 2, représente la bourse du sarigue crabier. L'os marsupial est indiqué par le chiffre 20. La poche n'est qu'un prolongement de la peau du ventre; elle contient dans l'épaisseur de son bord, dit M. Duvernoy (*Leçons d'anat. comp.*, VIII, p. 615), des fibres musculaires formant sphincter et constituant un muscle destiné à la fermer<sup>2</sup>.

Le grand oblique [15] s'attache aux bords externe et interne de l'os marsupial, au moins par son aponévrose; le grand droit [15] s'attache par la plus grande partie de son extrémité postérieure à l'os marsupial; le pectiné [k], par la supérieure. Le faisceau [15<sup>a</sup>] est le bord postérieur du grand oblique séparé par le muscle *iléo-marsupial* [21], et formant ainsi une sorte d'anneau sous-pubien. C'est probablement, dit M. Cuvier, le cinquième muscle de Tyson.

Ce muscle iléo-marsupial, ainsi nommé par M. Duvernoy, est un muscle mince, en forme de ruban, qui s'attache à l'épine antérieure de l'os des iles, passe sous l'os marsupial après avoir traversé, comme sur une poulie de renvoi, la fente qui sépare le bord postérieur du grand oblique du reste du muscle, et va se fixer sur le côté de la poche. Il a évidemment pour but d'ouvrir celle-ci et de la rapprocher de la vulve au moment de la production prématurée des petits.

Outre les muscles grand et petit oblique [13 et 14, pl. 176, fig. 5], qui s'attachent à l'os marsupial, un muscle triangulaire [16], analogue du pyramidal, se fixe à tout son bord interne. Avec celui du côté opposé, il remplit tout l'intervalle qui existe entre les deux os et doit servir à les rapprocher l'un de l'autre.

On voit dans la poche sept paires de mamelons qui se rapprochent en grossissant d'avant en arrière, et de chaque côté un enfoncement rempli, pendant la vie, d'une substance odorante.

(1) C'est par erreur que, sur la planche 176, fig. 3, ces muscles sont marqués de la lettre x; ils devraient porter la lettre π, et ceux qui sont affectés de cette dernière lettre doivent, comme intérosseux, porter la lettre ρ.


(2) Ce bord n'existait plus dans l'individu qui a servi à M. Cuvier pour cette myologie.

SARIGUE CRABIER.

Pl. 174.




Imp. par Auguste Rey.




Goussier del.













# MYOLOGIE DU PHALANGER A FRONT CONCAVE.

(PHALANGISTA CAVIFRONS, T., Cuv., *Règ. an.*, t. I, p. 167.)

Planches 177 à 179, dessinées par M. CUVIER.

Le groupe des Phalangers est désigné par M. Cuvier lui-même comme le correspondant parmi les Marsupiaux de celui des Hérissons et des Musaraignes (*Règne anim.*, 1<sup>re</sup> édit., t. I, p. 171). Mais cette analogie, déduite principalement du système dentaire, n'a plus la même valeur quand on étudie la myologie de ce groupe. Le caractère le plus saillant du système musculaire chez le Hérisson c'est ce peaucier si merveilleusement disposé où l'animal rentre comme dans une bourse contractile pour ne plus offrir de toutes parts à l'extérieur que la peau hérissée de son dos. Destinés à vivre sur les arbres où ils poursuivent les insectes ou recherchent les fruits, les Phalangers ne montrent aucune trace de ce singulier et merveilleux appareil de défense : sveltes, allongés, puissamment musclés dans leurs extrémités abdominales et leur queue, ils semblent, pour le système locomoteur, une contre-partie exacte du corps trapu des Hérissons. Les analogies myologiques rapprocheront plus volontiers les Phalangers des Rongeurs du groupe des Rats, et il ne sera pas sans intérêt de comparer sous ce rapport les dessins relatifs au Phalanger à front concave avec ceux publiés un peu plus loin, et qui se rapportent au Surmulot. Les limites restreintes de ce texte ne me permettent pas d'entrer moi-même dans les détails de cette comparaison. Quant aux mains, situées aux extrémités abdominales, elles offrent quelques rapports avec celles des Lémuriens.

Les peauciers n'ont, chez les Phalangers, qu'un développement insignifiant [pl. 177, fig. 1]. La figure 2 de la planche 177 montre à la fois toute la première couche musculaire de la face latérale du corps. On y peut remarquer, avec un développement notable des muscles qui soutiennent l'occiput, une assez médiocre musculature de l'épaule. Ainsi, malgré l'existence d'une clavicule, on observe cette fusion d'une portion du deltoïde avec le trapèze que M. Cuvier désigne sous le nom significatif de deltoïdo-trapèze [+a], et que présentent plusieurs Rongeurs. La vaste étendue du grand dorsal [i] contraste avec les proportions modestes du deltoïde [k'], des diverses portions du triceps brachial [t, t']; elle me semble facile à comprendre chez un animal grimpeur dont le membre antérieur, fixé par les extrémités digitales, doit servir de point d'appui au corps dans son mouvement ascensionnel. Cette disposition est en rapport avec le riche développement musculaire de l'avant-bras, où se fait remarquer aussi bien la vigueur des muscles que leur nombre. Les mouvements des doigts ont leur indépendance assurée par des muscles spéciaux; ainsi M. Cuvier a inscrit cette note sur son dessin : « Outre le long abducteur du pouce [t], il y a un long extenseur du pouce [ζ] [pl. 179, fig. 4]; un long extenseur de l'index et un du médius tous attachés le long du cubitus; l'extenseur du petit doigt [ε'] ne donne pas à l'annulaire. » Dans la figure 2 de la planche 177, la lettre ε<sup>2</sup> désigne collectivement ces trois longs extenseurs des trois premiers doigts. Le membre postérieur, vigoureux et trapu, est plus uniformément développé. Le bassin, qui simultanément sert de base aux deux membres et à la queue, est peut-être plus charnu que l'épaule, quoique évidemment les muscles qui lui sont propres ne soient pas les plus forts, mais bien le biceps [q], le droit antérieur de la cuisse [p], le vaste externe [m], et aussi [pl. 179, fig. 1] le grêle interne [u], le couturier [t] et enfin les demi-tendineux [r] et demi-mem-




braneux [s]. Mais on peut facilement constater, par opposition [pl. 179, fig. 3], les faibles dimensions des muscles plus spécialement propres à la cuisse et au bassin. En un mot, tous les muscles moteurs de la jambe sont développés; mais la cuisse proprement dite est frappée du même arrêt de développement que le bras nous a déjà montré. Les figures 2 et 3 de la planche 178 et la figure 3 de la planche 179 permettent de constater aussi que la jambe et les doigts du membre postérieur sont plus riches encore dans leur myologie que les parties correspondantes du membre antérieur. Nous en parlerons un peu plus bas.


La planche 178 retrace, dans sa figure 1, la deuxième couche de cette même face latérale du corps. On peut y remarquer la richesse des muscles du cou et le développement des droits et pyramidaux de l'abdomen. Voici la note inscrite par M. Cuvier sur son dessin : « Le rhomboïde trachélien [c'], ou languette extérieure du grand dentelé, est ici fortement uni au reste de la portion trachélienne du grand dentelé. » Au membre postérieur [r', q'] sont des accessoires du biceps et du demi-tendineux. Tout ici semble calculé pour donner plus d'énergie à la flexion vers le bassin, de la jambe et de la queue; c'est sans doute pour que l'animal puisse enlever son corps avec l'extrémité abdominale, ou avec sa queue prenante. La figure 2 de la même planche représente la troisième couche de la face latérale. C'est par erreur que la planche porte deuxième couche. Elle montre le faible développement des muscles de l'épine, et en même temps la multiplicité de ceux de la jambe. Dans cette dernière partie, il faut remarquer, à l'insertion supérieure commune aux vestiges du soléaire et au gastrocnémien externe [α], un os sésamoïde placé sur la tête du péroné. Les fléchisseurs sont multipliés comme l'étaient les extenseurs à l'avant-bras. Enfin la figure 3 montre la face externe de la jambe. M. Cuvier y a joint les notes suivantes : « Il y a un petit péronier pour chacun des deux derniers doigts. Le pédieux [o par erreur, au lieu de 2] va aux deux doigts soudés. L'extenseur commun ne donne qu'au deuxième de ceux-ci, c'est-à-dire au médus. »

La planche 179 renferme cinq figures. La première est destinée à montrer la face ventrale du corps. M. Cuvier dit en marge : « Le deltoïdo-trapèze [+a] passe sur le deltoïde [k] sans interrompre la communication de sa partie claviculaire avec sa partie scapulaire. » La figure 2 montre la deuxième couche de l'épaule du cou et du haut de la poitrine; le grand pectoral [j] est fort développé. Les figures suivantes sont consacrées aux détails de la myologie des membres. M. Cuvier y a ajouté des notes au crayon que je vais reproduire. Figure 3 : « Les deux portions du biceps [r et r'] restent distinctes jusqu'à leur insertion. » Figure 4 : « Le fléchisseur du pouce [λ] se rend sur le tendon du fléchisseur commun [κ]. Le fléchisseur sublime [κ], intimement uni au fléchisseur du pouce, donne des tendons perforés à l'index et au médus qui reçoivent des languettes du fléchisseur profond [μ²]. Les tendons perforés des deux derniers doigts naissent entièrement du fléchisseur profond. » Figure 5 : « Le fléchisseur du pouce donne cinq tendons; deux muscles qui naissent avec lui à l'os surnuméraire de la tête du péroné et qui s'en séparent vers le milieu de la jambe, donnent des tendons perforés aux trois derniers doigts. Le dernier vient du plus externe de ces deux muscles, les deux autres du plus interne. »

Telle est la myologie de ce Grimpeur à dentition d'Insectivore; les muscles des extrémités prédominent d'une manière intéressante, et malgré l'indication du régime fourni par les dents, comme il court les branches d'arbres pour y chercher sa vie, il rappelle, dans son système musculaire, des dispositions plus communes chez les Phytophages, et surtout les Rongeurs essentiellement frugivores.














Fig. 2.  
Face ventrale de la  
partie antérieure  
du tronc.  
2<sup>e</sup> couche.




Fig. 3.  
Face interne de  
l'extrémité antérieure  
1<sup>re</sup> couche




Fig. 4.  
Face interne de  
l'avant bras.  
2<sup>e</sup> couche.




Fig. 5.  
Face interne de l'extrémité postérieure  
2<sup>e</sup> couche de la cuisse et 1<sup>re</sup> couche  
de la jambe.



Fig. 1.  
Face ventrale



# MYOLOGIE DU KANGUROO-RAT

(*MACROPUS MINOR*, Shaw., Cuv., *Règ. an.*, t. I, p. 185, 2<sup>e</sup> édit.)

Planches 180 à 182, dessinées par M. CUVIER.

Le genre Kangaroo-rat établit une véritable transition des Sarigues et des Péramèles au groupe si singulier des Kangeroos. Nous n'avons pas à rappeler les rapports que peut établir le système dentaire entre ce petit genre et les autres de la classe des Mammifères; mais, quant à la myologie, ce sont des Sarigues sauteurs, et dont, par conséquent, les membres postérieurs offrent une disposition musculaire toute spéciale. Les trois planches que nous publions font connaître surtout les muscles des membres et de l'épine. La première planche (180) est curieuse à comparer avec celle du Sarigue crabier [pl. 174]; toute la moitié antérieure du corps présente le même plan myologique. Le cou, cependant, a perdu de son développement; ce sont les formes plus grêles d'un Frugivore dont les mâchoires ne doivent plus attaquer une proie ni soulever une masse pesante. M. Cuvier a mis en note auprès de la figure 3 de la planche 181: «Il n'y a pas de splénus du col.» Le Sarigue crabier n'en a pas non plus. Le membre antérieur est raccourci, surtout dans la région de la main, et il est moins libre dans les mouvements d'extension. Le long supinateur et les radiaux s'insèrent si haut sur l'humérus, que le bras doit rester dans une flexion habituelle sans effort de la part de l'animal. On peut constater plus facilement encore cette disposition dans la figure 3 de la planche 181. Là on voit la face interne de l'avant-bras, et l'on peut remarquer le développement général des muscles fléchisseurs de la main et des doigts. Une note de M. Cuvier a été inscrite à côté de cette figure: «Le fléchisseur profond, dit-il, a un ventre radial [ $\mu$ ] et un cubital [ $\mu^2$ ] distincts jusqu'au poignet, un ventre huméral qui s'y joint au même point et un lambeau qui va du fléchisseur sublime au ventre radial.» Quant aux muscles de l'épaule, on doit remarquer aussi le faible développement du deltoïde et du système extenseur et releveur du bras. En un mot, tout ici annonce des membres antérieurs organisés pour saisir et arracher à l'aide d'ongles puissants; mais détournés de leurs usages ordinaires de locomotion et de sustentation.

Quant au membre postérieur, la planche 180 ne montre que la couche superficielle des muscles de la cuisse. Dans les planches suivantes nous est représenté l'ensemble du membre. On peut remarquer ici, en [ $r^1$ ], un muscle accessoire qui unit le demi-nerveux et le biceps; en [a], le grand fessier se voit à travers l'aponévrose.

La planche 181 nous montre les muscles du tronc, et dans la figure 3 ceux de la face interne de l'avant-bras. Avec les membres antérieurs, les pectoraux [fig. 1] ont perdu de leur étendue comparativement à ceux du Sarigue crabier. Un faisceau profond du grand pectoral [+j] rapproche

l'épaule vers la ligne médiane. Cette figure et la figure 2 montrent, dans le cou du Kanguroo-rat, la même musculature que possède le Sarigue précédemment figuré. On y retrouve même le faisceau claviculaire du trapèze [+a]. Le sus-clavier [h'] du Sarigue crabier [pl. 176, fig. 1] ne se trouve plus ici; quelques Rongeurs offriront une disposition analogue. Les figures 3 et 4 représentent les muscles de l'épine; à côté du splénus rejeté [I et I'] se trouve un muscle dont la lettre a été oubliée : c'est le digastrique du cou. M. Cuvier a mis en note à côté de la ligne ponctuée qui se voit dans la figure 1, à l'origine du long dorsal : « Ici, sous l'aponévrose de l'épineux et du long dorsal, commence un muscle de la queue. » Ce muscle s'aperçoit d'ailleurs [figure 4] dans le dessin de la deuxième couche des muscles de l'épine. Le long dorsal [B] y a été rejeté sur le côté et en bas pour laisser voir ce caudien latéral supérieur ou sacro-coccygien supérieur, indiqué par la lettre R. En T, se voit un autre muscle de cet appendice si développé chez le Kanguroo : c'est le caudien supérieur ou interépineux supérieur. Ainsi les insertions de ces muscles puissants remontent jusqu'aux dernières vertèbres dorsales, en occupant toute la partie lombaire de la colonne.

Toute la dernière planche [182] est consacrée à l'étude du membre inférieur, et ce n'est pas la partie la moins intéressante de cette myologie; mais avec le peu d'espace qui m'est laissé, il me paraît plus utile d'étudier celui du Kanguroo géant. Je renverrai donc au texte de la myologie suivante les lecteurs qui chercheraient des détails sur la structure du membre postérieur des Kanguroos. Je relaterai seulement ici les notes marginales de M. Cuvier relatives aux figures de la planche 182. Dans la figure 2 on trouve un pyramidal [f] et un second pyramidal [f']. M. Cuvier dit, en parlant du premier : « Ce pyramidal est plutôt l'analogue de la partie inférieure du moyen fessier; alors la deuxième partie du moyen fessier [+a'] représenterait le pyramidal. » Dans la figure 4, entre les muscles iliaque [g] et psoas [h] d'une part, et le premier adducteur [l] de l'autre, s'aperçoivent deux muscles qu'on a omis d'indiquer par une lettre explicative. Le postérieur est le pectiné, grêle et mince comme on peut le voir; l'autre est un muscle ainsi désigné par M. Cuvier : « Muscle propre placé sur le pectiné, et allant de l'os marsupial s'unir au bord inférieur de la deuxième portion du vaste interne [n']. »

Ad. F.

KANGUROO RAT.  
*Macropus minor* (Shuw)

Pl 180.




180

180












Fig. 1.

Face externe de  
l'extrémité postérieure  
2<sup>e</sup> coudée de la cuisse  
et 1<sup>re</sup> de la jambe.




Fig. 3.

Face supérieure  
du pied.




Fig. 2.

Face externe  
de la cuisse  
3<sup>e</sup> coudée.




Fig. 4.

Face interne de  
l'extrémité postérieure




Fig. 5.

Face inférieure  
du pied.



# MYOLOGIE DU KANGUROO GÉANT

(MACROPUS MAJOR, Shaw., Cuv., *Règ. an.*, t. I, p. 186, 2<sup>e</sup> édit.).

Planches 183 à 203, dessinées par M. LAURILLARD.

Représentant d'un des genres les plus curieux de la classe des Mammifères, le Kangouroo géant atteint jusqu'à six pieds de hauteur. Les membres antérieurs sont trop disproportionnés avec les postérieurs pour lui permettre de marcher à quatre avec facilité. Le principal intérêt de cette myologie s'attache donc à l'étude de la portion postérieure du corps.

Les quatre premières planches doubles [183 à 191] montrent les couches musculaires successives de la face latérale du corps. J'ai peu de remarques à faire sur ces dessins d'ensemble. On peut y constater d'importantes différences avec les formes générales du Kangouroo-rat. Ventre plus gros, surmonté d'un thorax pyramidal; bras et cuisse raccourcis comparativement aux avant-bras et surtout aux jambes; tout annonce enfin un animal dont le mode de station s'écarte de la règle ordinaire, et qui doit se supporter sur le train de derrière, vers lequel est abaissé, autant que possible, le centre de gravité. Le peaucier est médiocrement développé [pl. 183 et 184]; sur la portion cervicale de ce muscle on voit, partant de l'oreille, un dessin irrégulier : c'est l'emplacement de la glande parotide. Le tronc, dans ces dessins, n'offre rien à noter, mais les détails de sa structure sont complétés par les planches 191 et 192-193 et 194. La figure 2 de la planche 191 et 192 montre la disposition curieuse des fibres du peaucier de chaque côté de la poche. Les muscles de l'épaule sont peu développés, comme on devait le prévoir; leurs insertions, ainsi que celles des muscles du bras, maintiennent celui-ci dans une flexion habituelle; le triceps huméral, le brachial interne [pl. 185 et 186-187 et 188-193] sont remarquablement développés et insérés de manière à mouvoir énergiquement l'avant-bras. La main offre des particularités curieuses dans sa musculature. Courte, ramassée, armée d'ongles puissants, elle est constituée surtout comme une griffe. La planche 193 en montre les détails, déjà présentés sous une autre face à la planche 185 et 186. Dans cette dernière planche on étudiera les extenseurs de la main et des doigts. Ces derniers sont doués de puissances musculaires énergiques, mais on est étonné du soin avec lequel sont réunis tous leurs tendons de manière à ôter toute indépendance au mouvement des doigts. Un fait aussi très digne d'attention, c'est la force du long abducteur du pouce. Il est facile de s'assurer que les fléchisseurs de la main et des doigts [pl. 193] ont une disposition analogue à celle des extenseurs, plus marquée peut-être, et destinée à une flexion énergique des doigts, sans aucune indépendance entre eux. Le fléchisseur profond fournit une languette musculo-



tendineuse [pl. 195, fig. 2] qui va s'insérer aux os de l'avant-bras, et doit entraîner cet article dans le mouvement de flexion des doigts et de la main. Le fléchisseur superficiel [ $\kappa$ ] est rudimentaire. Les notes suivantes sont inscrites auprès de la figure 2 de la planche 195 : « Le fléchisseur profond a un ventre radial [ $\mu$ ], un huméral [ $\mu'$ ], et un cubital [ $\mu''$ ]. Il y a de plus un ventre huméral [ $+\mu'$ ] produisant un tendon grêle qui s'unit au bord inférieur du tendon général. Le fléchisseur perforé [ $\kappa$ ] naît de ce dernier tendon, et donne une languette perforée au médus, et une à l'annulaire. Celle qui aurait dû aller à l'index [ $\kappa'$ ] se perd sur le tendon général. » Près de la figure 3 on lit encore : « Les deux portions du biceps [r et r'] sont unies dans le haut et n'ont qu'un seul tendon attaché au bord de la fosse glénoïdale. »

Je terminerai par un aperçu de la disposition générale des membres postérieurs. Une fois pour toutes, le développement musculaire y est énorme. Les planches 196 et 197 font voir les couches musculaires de la face interne de la cuisse et les muscles du bassin. Les psoas [g], le sacro-lombaire [B] ont une étendue considérable; les psoas remontent jusque dans le thorax. Les obturateurs [d, d'] et le carré de la cuisse [b] ont une ampleur qu'on leur voit rarement. La planche 198 fait voir les muscles de la jambe. Enfin à la planche 199 on trouve l'anatomie complète du pied; on remarquera [fig. 4] la disposition des tendons de l'extenseur commun [ $\zeta$ ] par rapport au tendon de l'extenseur spécialement affecté au grand doigt [ $\zeta^3$ ]; il joue à peu près le rôle du perforé pour le maintenir dans les moments d'action de son muscle. Il est intéressant de voir sur la figure 3 comment sont logés, dans ce pied long et étroit, les muscles nécessaires aux mouvements des doigts. L'adducteur du petit doigt [ $\nu^3$ ] est coupé de son insertion supérieure, son tendon venait de la partie interne du tarse. Voici d'ailleurs les notes que j'ai trouvées sur les dessins : [Pl. 185 et 186] « Deux ventres représentent le grand fessier et s'unissent en un long tendon qui va à la rotule. » [Pl. 189 et 190] « Le tendon [ $\gamma$ ] venant de la capsule du genou communique par des fibres charnues avec le plantaire [ $\gamma$ ] et le gastrocnémien externe [ $\alpha$ ]. En +  $\alpha$  est la coupe de la portion capsulaire de ce dernier muscle. Il y a un adducteur propre des deux petits doigts, caché sous les deux extenseurs et très grêle. » A la seconde figure sont annexées les notes suivantes : « L'attache de la partie antérieure du grand fessier [ $^2a$ ] se confond avec celle du vaste externe [m]; le tendon de la partie moyenne [ $^1a$ ] reçoit dans son trajet trois portions charnues [ $+\ ^1a$ ] qui naissent au bord postérieur du crural [o]. En général dans cet individu les muscles de la cuisse étaient liés les uns aux autres par des faisceaux charnus que chacun d'eux recevait de ses voisins. Le muscle  $a^2$ , analogue sans doute à la partie antérieure du petit fessier de la figure 4, n'était pas recouvert par le moyen fessier. Le muscle f' de la figure 4 était réuni par la portion supérieure au pyriforme. »

Les planches 200 et 201, 202 et 203 représentent le développement extraordinaire des muscles de la queue, et en même temps ceux de la portion cervicale de l'épine. Je ne pourrais rien en dire que l'inspection des dessins n'apprenne suffisamment.

AD. F.


















Laurillard del.




Imp. Auguste Bry Paris.










Laurillard del.



Imp. Auguste Bry, 114, r. du Bac, Paris.










Fig. 1.  
Face latérale  
2<sup>e</sup> couche












Fig. 2.  
Face ventrale  
pre cruche.




Fig. 1.  
Face dorsale.



















Fig. 1.  
Face interne  
du membre  
antérieur.

Leva-Jard, del.




Fig. 2.  
Face interne  
du bras  
2<sup>e</sup> coude.




Fig. 3.  
Face interne du  
bras  
3<sup>e</sup> coude.

Imp. Auguste Bray, Paris






Fig. 1.  
Face interne  
de la cuisse  
1<sup>re</sup> couche.





Fig. 2.  
Face interne  
de la cuisse.  
2<sup>e</sup> couche






Face interne  
de la cuisse  
3<sup>e</sup> couche.

Laurillard del

Imp Auguste Bry, Paris.












Fig. 1.  
Face supérieure  
du pied




Fig. 2.  
Face inférieure  
du pied.  
1<sup>re</sup> couche




Fig. 3.  
Face inférieure  
du pied.  
2<sup>e</sup> couche.







Fig. 2.

Muscle de la face  
inférieure de l'épine.






Fig. 1.

Muscles de la face  
supérieure de l'épine.














Fig. 1.  
Face latérale de l'épaule,  
muscles du dos soulevés,  
ceux du cou et de la queue  
en place.




Fig. 2.  
Face latérale de l'épine  
muscles du dos et de la queue relevés  
2<sup>e</sup> couche des muscles du cou.



# MYOLOGIES DE L'ÉCUREUIL COMMUN

(SCIURUS VULGARIS, Cuv., *Rég. an.*, tome I, p. 192, 2<sup>e</sup> édition)

## ET DU POLATOCHE

(SCIURUS VOLANS, Lin., *opere citato*, p. 194).

Planches 204 à 206, dessinées par M. CUVIER.

L'ordre des Rongeurs, dont l'Écureuil commence la série, est composé de petits Mammifères fouisseurs, sauteurs ou coureurs, mais dont les habitudes offrent une grande variété. Aussi leur système locomoteur présente-t-il plusieurs types que nos dessins feront connaître successivement.

Les deux genres dont nous nous occupons appartiennent à la division des Rongeurs à clavicules complètes et à cette famille d'animaux grimpeurs désignée souvent sous le nom de Sciuriens. L'Écureuil commun, véritable type de la famille, a un système musculaire en rapport avec son agilité, l'aptitude qu'il a pour saisir avec ses membres antérieurs, opposés l'un à l'autre, les objets dont il se nourrit, et l'énergie de sa mastication. Comme la plupart des Rongeurs, il offre deux massétiers [pl. 204], dont le surnuméraire [ $j^2$ ] s'insère sous l'œil, aux côtés du nez, passe par le trou sousorbitaire élargi, et vient s'insérer sur la face externe du maxillaire inférieur, au niveau des dents molaires. Le masséter ordinaire a ses fibres dirigées de façon à projeter la mâchoire en avant en la faisant glisser contre la supérieure. La figure 2 montre une autre portion du masséter [ $j^1$ ] que l'on voit seule dans la figure 2 de la planche 205.



Les muscles du cou offrent une disposition que reproduisent quelques autres animaux de cet ordre : le rhomboïde de la tête [c, +c, pl. 204, fig. 2] s'attache en partie à l'apophyse transverse de l'axis.

Le deltoïde [k,  $k^1$ ,  $k^2$ ] est partagé en une portion scapulaire, une acromienne, et une claviculaire. Les muscles de l'avant-bras et de la main sont nombreux et développés. M. Cuvier [pl. 204, fig. 2] dit dans ses notes : « Il y a outre l'extenseur commun [ $\varepsilon$ ], un extenseur du pouce et de l'index [ $\varepsilon^2$ ], un extenseur du médius et de l'annulaire [lettre oubliée], un extenseur de l'annulaire et du petit doigt [ $\varepsilon^1$ ]. Ces deux-ci ont une origine avec l'extenseur commun. L'annulaire a donc trois tendons. » Il ajoute [pl. 205, fig. 5] : « Le fléchisseur profond [ $\mu$ ] a trois ventres huméraux distincts dans toute leur longueur [ $\mu$ ,  $\mu$ ,  $\mu$ ], outre sa partie adhérente aux os de l'avant-bras [ $\mu^2$ ]. Le premier ventre [ $\mu$ ] donne le tendon du pouce. » Le grand pectoral [j] est développé et formé de faisceaux très distincts de direction variée [voyez pl. 205]. De nombreuses notes accompagnent

les dessins des membres postérieurs. Planche 204, fig. 2 : « L'espace marqué l' est celui qu'occupe un accessoire du deuxième adducteur ou un ligament auquel s'attache une portion de ses fibres. Le pédieux [9] donne à l'index et à l'annulaire, les deux doigts suivants ont chacun un petit péronier. » Je trouve aussi [pl. 205, fig. 1] : « Le fléchisseur commun se termine à un os surnuméraire de la base du pouce; la chair carrée donne une languette au tendon du plantaire qui va au petit doigt. Il y a de plus deux petits muscles adhérents au fléchisseur du pouce et allant à ce qu'il paraît aux tendons du plantaire destinés aux troisième et quatrième doigts. » On remarquera [pl. 204, fig. 2] cet accessoire coccygien du biceps, long, grêle et rubané [q] que possèdent plusieurs Carnivores et un grand nombre de Rongeurs. Comme chez les Singes et beaucoup d'autres Mammifères, les Rongeurs ont le grand fessier [a] moins développé que le moyen et le petit fessier [a<sup>1</sup> et a<sup>2</sup>].

Le Polatouche est un petit Écureuil auquel la peau de ses flancs, étendue entre le membre antérieur et le postérieur, permet de se soutenir dans l'air pour passer d'arbre en arbre. On peut voir [pl. 206] que le peaucier a été entraîné avec la peau dans ce repli membraneux. Les membres ont des formes plus élancées qui, dans les bras surtout, rappellent quelque peu celles de l'Homme. Le grand dorsal [i] paraît composé de deux portions inégales. Une partie des fibres du peaucier [5<sup>d</sup>] se réunissent vers l'aisselle et vont, par un tendon mince [+], s'insérer sur l'humérus [fig. 2]. Cette myologie présente d'ailleurs les plus grands rapports avec celle de l'Écureuil commun.

Ad. F.



Cuvier del

Imp. Auguste Hry Paris.








Fig. 2.  
Face ventrale, membres antérieurs,  
droit 1<sup>re</sup> couche, gauche 2<sup>e</sup> couche,  
membres postérieurs, gauche 1<sup>re</sup>  
couche, droit 2<sup>e</sup> couche.



Fig. 3.  
Membre antérieur gauche  
Face interne.





Fig. 2.

Face inférieure du corps  
1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> couches.



Cuvier del.

Imp. Auguste Goy Paris

Fig. 1

Face supérieure du corps.  
peaucier et couche superficielle





# MYOLOGIE DE LA MARMOTTE DES ALPES

(ARCTOMYS ALPINA, Gm., *Rég. an.*, tome I, p. 196, 2<sup>e</sup> édition).

Planches 207 à 211, dessinées par M. CUVIER.

On peut considérer le genre Marmotte comme un type intermédiaire entre les Rongeurs claviculés grimpeurs, comme les Sciuriens, et ceux qui s'enfoncent plus ou moins dans le sol, comme diverses espèces appartenant à la famille des Rats ou voisines de cette famille. On voit donc apparaître ici certaines dispositions myologiques qui caractériseront des Rongeurs fouisseurs dont nous occuperons plus tard.

La première planche [pl. 207] montre l'ensemble de la couche superficielle des muscles sur la face latérale du corps. Un peaucier vigoureux [2 et 4] unit l'acromion aux mâchoires. Le trapèze [a, a', a''] a ses trois portions bien distinctes, dont la première [a] va s'insérer à la clavicule à côté du cléido-mastoïdien [b']. L'épaule est fortement musclée; le deltoïde offre trois portions: les deux premières [k', k''] sont scapulaires, leur insertion ayant lieu sur l'épine de l'omoplate et sur l'acromion; l'autre [k], claviculaire, est longue et ne s'attache plus au bras, mais bien à l'avant-bras, entre le brachial interne [s] et le biceps ou scapulo-radial [r]. Les triceps [t, t', t''] sont très forts; la portion t'', dite quatrième extenseur, naît des fibres du grand rond désigné mal à propos par la lettre i. L'avant-bras est très solidement musclé, et les muscles moteurs des doigts y sont aussi bien développés que les moteurs de la main sur l'avant-bras. Le long supinateur a deux portions charnues très vigoureuses [v et v'], dont la seconde est recouverte par deux radiaux externes très forts [δ et δ']. On voit en 5<sup>e</sup> et 5 les débris d'un peaucier très développé et qui semble prendre d'autant plus d'extension que l'animal est plus exclusivement destiné à fouir. Au membre postérieur, le grand fessier [a] est divisé en deux portions dont la seconde [a'] naît beaucoup plus en arrière. Les fibres qui unissent en bas le muscle du fascia-lata [x] à la partie interne de la cuisse sont indiquées par M. Cuvier comme des vestiges du muscle couturier. Les muscles qui recouvrent le bassin et la cuisse paraissent en général grêles par rapport aux muscles de l'épaule: c'est une organisation d'animal fouisseur.

L'examen de la planche 208 nous offre d'abord un dessin d'ensemble des peauciers [fig. 1], qui sont assez nettement développés. Puis la figure 2 nous permet d'apercevoir la deuxième couche des muscles cervicaux. C'est d'abord un double rhomboïde, l'un appartenant au cou [c], l'autre propre à la tête [c']. Le muscle marqué + c est ce muscle désigné par M. Cuvier, dans les *Leçons d'anatomie comparée*, comme un releveur de l'omoplate dont l'insertion a passé au bord supérieur externe de cet os et qui peut alors être regardé comme un rhomboïde du cou. Le

Phalanger, l'Éléphant, présentent aussi cette disposition. Entre le rhomboïde de la tête [c] et ce muscle + c se voit le bord du splénus. On peut étudier sur la figure 3 la couche profonde de la face externe de l'avant-bras : v' est ce long supinateur profond que j'ai signalé sur la planche 207; ε' est l'extenseur propre de l'index. Les figures 4 et 5 font connaître les divers muscles de la face interne du membre antérieur. Ce qui peut frapper d'abord l'attention, c'est le riche développement des muscles de l'avant-bras. L'épaule est comparativement moins bien partagée sur cette face. Les muscles c, c', + c sont les rhomboïdes; s désigne par erreur un faisceau du peaucier qui devrait porter l'indication 5°; j, j', j'' sont les diverses parties du grand pectoral; e désigne l'insertion de l'omo-hyoïdien, g celle du grand dentelé et i celle du grand dorsal. Le muscle u' est un anconé interne singulièrement développé; il est facile de suivre sur l'index général mis en tête de l'ouvrage la désignation des autres muscles. La figure 5 montre une lettre x' qui correspond à une portion du carré pronateur omise sur la lithographie, et qui dépasse le bord du fléchisseur [μ]. A l'extrémité inférieure de l'humérus on voit en x l'insertion du rond pronateur, en γ celle du radial interne, en λ celle du long fléchisseur du pouce. Le muscle désigné s' dans les deux figures devrait porter la lettre k; c'est la portion claviculaire du deltoïde qui va s'insérer à l'avant-bras; s est le brachial interne et r le biceps; 6 est la partie supérieure du cubital interne.

La planche suivante [pl. 209] nous retrace d'une part la disposition du peaucier que nous verrons si développé dans le Rat-taupe; de l'autre les muscles du cou et du thorax vus à la face ventrale du corps.

La myologie du membre inférieur est démontrée dans les trois figures de la planche 210. L'aponévrose du biceps [fig. 1] enveloppe fortement la jambe. En t se voient les vestiges du couturier. Les muscles de la jambe et du pied sont très développés sans rien offrir qui fixe particulièrement l'attention. La figure 2 montre la plante du pied, dont la figure 1 fait voir la face supérieure. La figure 3 montre la même face interne du membre postérieur, mais du côté opposé à celui de la figure 2. M. Cuvier y a joint la note suivante : « Le fléchisseur commun des doigts [t' voisin du tibia] ne va qu'à l'os surnuméraire placé contre le scaphoïde. C'est le fléchisseur du pouce [t'] qui donne les tendons perforants et le plantaire les perforés'. » Cette même figure fait voir le grand développement des psoas.

Les muscles de l'épine figurés dans la planche 211 ont une masse commune qui rappelle un peu celle de l'Homme. On voit le droit antérieur de l'abdomen [fig. 1-15] remonter jusqu'à la première côte. L'épineux du dos [fig. 2-A] a été relevé pour laisser voir les parties sous-jacentes. La force des insertions inférieures des muscles spinaux explique la facilité que possède la Marmotte pour se tenir assise sur son train de derrière sans que les membres antérieurs portent à terre. Le cou a ses couches profondes vigoureuses et bien musclées.

(1) On a omis dans la figure 3 la lettre c; on a mis seulement t, mais la figure 2 porte l'indication exacte.







Fig. 3.

Face externe de l'avant bras.  
couche profonde







Fig. 5.

Face interne de l'avant bras  
couche profonde.
















Fig. 1.  
Muscles de l'épine  
1<sup>re</sup> couche.




Fig. 2.  
Muscles de l'épine  
2<sup>e</sup> couche.





# MYOLOGIE DU SURMULOT

(MUS DECUMANUS, Pall., Cuv., *Rég. an.*, t. I, p. 201, 2<sup>e</sup> édition).

Planches 212 et 213, dessinées par M. CUVIER.

Le grand genre *Mus* de Linnée renferme une immense quantité de Rongeurs très variés dans leurs formes et dans leurs allures, caractérisés par l'existence de quatre doigts en avant, cinq en arrière, et par une queue arrondie, écailleuse, hérissée. Les Rats proprement dits, Campagnols, Lemmings, Loirs, Hamsters, Rats-taupes, Hélamys, Marmottes, s'y trouvaient réunis avec les Lémuriens. Laissant de côté ce dernier groupe mieux connu et mieux classé aujourd'hui, nous avons encore une longue série d'animaux très peu semblables, mais dont une grande partie fouit la terre, soit pour y chercher habituellement les racines qu'ils doivent ronger, soit pour s'y créer des retraites ou des greniers. Nous avons déjà publié la myologie de la Marmotte, nous donnons aujourd'hui celle du Surmulot, et ensuite celle du Rat-taube. De ces trois types, le Surmulot offre les plus grandes analogies avec les Rongeurs qui vivent sur les arbres, comme ceux de la famille des Sciuriens. C'est donc à la fois un animal fouisseur et grimpeur que font connaître nos deux planches, et son système musculaire demande à être étudié à ce double point de vue. C'est comparativement avec l'Écureuil et la Marmotte qu'il est intéressant de suivre les dispositions qu'il présente.

La planche 212 montre les deux couches principales des muscles de la face latérale du corps.

Le trapèze [fig. 1, a, a', a''] est vaste, et ses insertions postérieures se font très bas; le deltoïde [k] est assez développé; le grand dorsal [i] est petit. A l'avant-bras l'anconé ne paraît pas exister. La cuisse est fortement musclée : le biceps [q] a une origine coccygienne [+q] et une seconde origine ischiatique [++q]. La figure 2 montre que le demi-nerveux [r] naît aussi d'une double insertion de l'ischion [r+] et du coccyx [r-]. Sous l'origine coccygienne du biceps [q-] se voit un cruro-coccygien [s'] qui peut être considéré comme un accessoire du demi-nerveux [s]. Près de cette figure M. Cuvier a inscrit la note suivante : « L'omo-basilaire [omo-trachélien d] s'insère au devant du corps de la première vertèbre. »

La planche 213 représente dans sa figure 1 la face ventrale du corps avec le peaucier d'un côté et la première couche de l'autre. « Tout le peaucier latéral [x], dit M. Cuvier dans une note, va se rendre à la partie antérieure du grand pectoral [j] et antérieure du grand dorsal [i]. » Les figures 2 et 3 détaillent la myologie du membre thoracique. L'extenseur propre du petit doigt [ε'] se rend aux deux derniers doigts, comme cela arrive fréquemment; il y a un extenseur du doigt médian [γ]. Le deltoïde a une composition assez compliquée. Dans la figure 3 on peut remar-

quer une disposition singulière des insertions du peaucier latéral, du grand pectoral et du grand dorsal. M. Cuvier, dans une note marginale, l'explique ainsi : « La portion profonde du grand pectoral [j'], les fibres antérieures de la portion redoublée [j] et du peaucier [5°] vont à l'apophyse coracoïde. Le grand dorsal [i] donne un tendon de communication avec le peaucier. »

La figure 4 est consacrée à l'étude du membre postérieur. On peut y remarquer entre les trois adducteurs, et en dedans de ces trois muscles, un adducteur rotulien coupé vers la fin de son premier tiers; ce muscle est représenté, figure 4, sous la lettre + l<sup>2</sup>. Il existe deux grêles internes [u et +u]. A la figure 5 se rapportent les annotations suivantes de M. Cuvier : « Le tendon du fléchisseur commun [+t] s'épanouissait en une vaste aponévrose plantaire. Le plantaire grêle [γ] devient charnu sous le pied et donne des tendons perforés aux quatre doigts. Deux petits muscles joignent sa face profonde à la patte d'oie du fléchisseur du pouce [t] qui donne les tendons perforants comme à l'ordinaire. »

Ad. F.

Fig. 1.

Face latérale  
1<sup>re</sup> couche.



Fig. 2.

Face latérale  
2<sup>me</sup> couche.






Fig.1.

Face inférieure du corps.  
Peaucier, 1878 couche.




Fig.5.

Face interne de l'extrémité  
antérieure.




Fig.2.

Face externe de l'extrémité  
antérieure




Fig.4.

Face interne de  
la cuisse gauche,  
couché profond.




Fig.3.

Face postérieure  
et interne de la  
jambe gauche.





# MYOLOGIE DU RAT-TAUPE

(MUS CAMPENSIS, L., Cuv., *Règ. an.*, t. I, p. 201).

Les Rats-Taupes forment un petit genre de rongeurs souterrains peu semblables aux Rats, mais plus rapprochés, par leurs habitudes, des Taupes dont ils portent le nom. Cependant, au lieu de fouir avec la rapidité merveilleuse que montrent ces insectivores pour atteindre les larves d'insectes ou les vers, les Rats-Taupes, qui vivent de racines, cheminent plus lentement dans leurs galeries. Ces êtres singuliers sont si bien destinés à une existence souterraine que leur œil, invisible à l'extérieur, est réduit à un petit point noir caché sous la peau. C'est en tenant compte de ces singulières habitudes que l'on saisira les faits intéressants de la myologie de ce petit animal.

Les membres, plus également développés que ceux de la Taupe, se prêtent sans doute mieux à la marche. On n'étudiera pas sans intérêt, sur la Planche 216, la riche musculature de l'épaule, surtout si on la compare à celle de la Taupe, de la Marmotte et du Castor.

La tête est mue par des muscles puissants, mais ses mouvements doivent avoir plus de force que d'étendue; pour s'en convaincre, il suffira de considérer la disposition myologique du cou; et, pour en comprendre les harmonies, il suffira de se rappeler qu'il s'agit ici d'un animal fouisseur et aveugle.

Mais l'organisation des muscles peauciers est l'indication la plus saillante des habitudes souterraines de l'animal. Cette organisation remarquable offre une complication que peu d'animaux peuvent dépasser, à moins d'avoir, comme le hérisson, une fonction toute spéciale à exercer au moyen de ces muscles.

## INDICATION DES MUSCLES.

### 1° *Muscles peauciers.*

(Pl. 214, fig. 1, 2; — 215, fig. 1.)

1. — Fronto-occipital.

1<sup>a</sup>. — Surcilier.

2. — Facien.

3. — Cervico-facien.

4, 4', +4, ++4. — Faisceaux du thoraco-facien, naissant

de la région hyoïdienne, de la région sternale, du cubitus (+4, peaucier cubito-zygomatique) ou de l'omoplate (4', peaucier acromio-maxillaire), pour se distribuer sur les côtés de la tête.

5<sup>a</sup>, 5<sup>b</sup>, 5<sup>c</sup>. — Dermo-humérien.

### 2° *Muscles de la face et de l'os hyoïde.*

(Pl. 214, fig. 2; — 215, fig. 1; — 216, fig. 1.)

j. — Masséter (sa lettre a été oubliée sur la figure 2 de la Planche 214).

q. — Digastrique.

### 3° *Muscles de l'épine.*

(Pl. 215, fig. 1, 2.)

P. — Carré des lombes.

| Q. — Ischio-caudien ou Ischio-coccygien externe.

## MYOLOGIE DU RAT-TAUPE.

### 4° *Muscles du membre thoracique.*

(Pl. 214, fig. 2; —215, fig. 1; —216, fig. 1, 2, 3).

- |   |   |
|---|---|
| a, a'. — Trapèze, portion occipito-cervicale.                               | mais il n'y a pas de coraco-brachial. » (Note de Cuvier.)   |
| a <sup>2</sup> . — Sa portion dorsale.                                      | s. — Brachial interne.  |
| b. — Sterno-cléïdo-mastoïdien.  | t. — Portion scapulaire du triceps brachial (extenseur postérieur).   |
| c <sup>1</sup> , c <sup>2</sup> . — Rhomboïde.                              | t <sup>1</sup> . — Sa portion humérale externe (l'indication t <sup>1</sup> , Pl. 216, fig. 3, doit se lire : t). |
| d. — Omo-trachélien.  | t <sup>2</sup> . — Sa portion humérale interne (extenseur interne).   |
| e. — Omo-hyoïdien.  | t <sup>3</sup> . — Sa portion allant au grand dorsal (4° extenseur).  |
| + . — Scapulo-clavien, naissant de l'omoplate pour se fixer à la clavicule. | +t <sup>2</sup> . — Portion accessoire, ou Extenseur inférieur interne.   |
| g. — Grand dentelé.   | x. — Rond pronateur.  |
| h. — Sous-clavier.  | α. — Palmaire grêle.  |
| +h ou +h'. — Deuxième sous-clavier.   | ε. — Cubital interne.   |
| i. — Grand dorsal.  | ε'. — Cubital externe.  |
| j, j <sup>1</sup> , j <sup>2</sup> . — Diverses portions du grand pectoral. | γ. — Radial interne.  |
| k. — Portion claviculaire du deltoïde.                                      | δ. — Radial externe.  |
| k'. — Portion scapulaire de ce muscle.                                      | ε. — Extenseur commun.  |
| l. — Sur-épineux.   | ε <sup>1</sup> . — Extenseur des deux derniers doigts.  |
| m. — Sous-épineux.  | ε <sup>2</sup> . — Extenseur propre de l'index.   |
| n. — Sous-scapulaire.   | ι. — Long abducteur du pouce.   |
| o. — Grand rond.  |   |
| r. — Biceps brachial. « Le biceps a ses deux têtes,                         |   |

### 5° *Muscles du membre abdominal.*

(Pl. 214, fig. 2; —215, fig. 1, 2, 3; —216, fig. 1.)

- |   |  |
|---|--|
| a. — Grand fessier  | x. — Muscle Fascia-lata, confondu avec le Grand fessier.   |
| a'. — Moyen fessier.  | α. — Gastrocnémien externe.  |
| a <sup>2</sup> . — Petit fessier.                                   | α <sup>1</sup> . — Gastrocnémien interne (on a oublié cette lettre sur ce muscle dans la figure 1 de la Planche 216).  |
| b. — Carré de la cuisse, ou Ischio-trochantérien.                   | ε. — Soléaire.   |
| e. — Jumeau supérieur.  | γ. — Plantaire grêle.  |
| e'. — Jumeau inférieur.   | δ. — Tibial, ou Jambier antérieur.   |
| h. — Psoas.   | δ'. — Tibial, ou Jambier postérieur.   |
| i. — Iliaque.   | ε. — Long péronier.  |
| k. — Premier pectiné.   | ε <sup>2</sup> . — Quatrième péronier : à côté et en avant, se voit le Court péronier; le Moyen est caché par le quatrième. M. Cuvier a inscrit sur le dessin cette note : « Il y a quatre péroniers, dont un pour le quatrième doigt. »   |
| k'. — Deuxième pectiné.   | ζ. — Long extenseur commun.  |
| l'. — Adducteur moyen.  | ζ <sup>1</sup> . — Long extenseur du pouce.  |
| l <sup>2</sup> . — Long adducteur.                                  | ι. — Long fléchisseur commun.  |
| m. — Vaste externe.   | ι <sup>1</sup> . — Long fléchisseur du pouce. « Le court fléchisseur (vaguement indiqué sous la plante du pied, figure 1, planche 216) est charnu comme dans le rat, et m'a paru donner aux cinq doigts. » (Note manuscrite de M. Cuvier.) |
| n. — Vaste interne.   |  |
| p. — Droit antérieur de la cuisse.                                  |  |
| q. — Biceps fémoral.  |  |
| +q. — Accessoire ischiatique du biceps.                             |  |
| ‡q. — Portion du biceps qui de l'ischion va s'attacher à la rotule. |  |
| r. — Demi-nerveux.  |  |
| s. — Demi-membraneux.   |  |
| u. — Grêle interne, ou Droit interne.                               |  |

AD. FOCILLON.



RAT TAUPE DU CAP.  
(Mus capensis lin)

Pl. 214.




Fig. 1.  
Peaucier.




Fig. 2.  
Face latérale,  
le peaucier enlevé,  
1<sup>re</sup> couche.






Fig. 3.

Face externe de l'extrémité postérieure

3<sup>me</sup> couche




Fig. 2.

Face externe de l'extrémité postérieure

2<sup>me</sup> couche.






Fig. 2.

Face externe de l'extrémité antérieure.




Fig. 3.

Face interne de l'extrémité antérieure.






Fig. 1.

Face inférieure du corps.  
3<sup>me</sup> couche.





# MYOLOGIE DU CASTOR

(CASTOR FIBER, L., Cuv., *Règ. an.*, t. I, p. 102).

## INDICATION DES MUSCLES.

### 1° *Muscles peauciers.*

(Pl. 217, 218, 219, fig. 1; — 221, fig. 1.)

- |   |  |
|---|--|
| 2. — Facien.  | du peaucier qui se joint au Grand Dorsal. » (Cuvier.)  |
| 3. — Cervico-facien.  | 5 <sup>b</sup> . — Dermo-humérien. — Portion dorsale.  |
| 5 <sup>a</sup> . — Dermo-humérien. — Portion scapulaire.              | 5 <sup>c</sup> . — Dermo-humérien. — Portion latérale. |
| +5 <sup>a</sup> . — « En points sont marquées les fibres de la partie | +5 <sup>e</sup> . — Peaucier allant au Grand Pectoral. |

### 2° *Muscles de la face et de la région hyoïdienne.*

(Pl. 217, 218, 219, fig. 1; — 221, fig. .)

- |   |  |
|---|--|
| b. — Temporal ou Crotaphite.              | j <sup>1</sup> . — Masséter. — 2 <sup>e</sup> portion. |
| d. — Orbiculaire des paupières.           | l. — Orbiculaire des lèvres.                           |
| h. — Buccinateur.                         | p <sup>1</sup> . — Ptérygoïdien interne.               |
| i. — Zygomatique, unique.                 | q. — Digastrique.                                      |
| j. — Masséter. — 1 <sup>re</sup> portion. | x. — Crico-hyoïdien.                                   |

### 3° *Muscles de l'épine.*

(Pl. 220, fig. 1; — 221, fig. 2; — 225, 226.)

- |   |  |
|---|--|
| A. — Épineux du dos ou Tendino-épineux.                                       | N. — Petit Oblique ou Oblique supérieur ( <i>Atloïdo-post-mastoidien</i> ).        |
| B. — Long Dorsal.   | N <sup>1</sup> . — Grand Oblique ou Oblique inférieur ( <i>Axoido-atloïdien</i> ). |
| C. — Sacro-lombaire.  | P. — Carré des lombes.   |
| E. — Demi-épineux du cou.   | Q. — Ischio-caudien ( <i>Ischio-coccygien-externe</i> ).                           |
| E <sup>1</sup> . — Demi-épineux du dos.                                       | R. — Sacro-coccygien supérieur ( <i>Lombo-sus-caudien</i> ).                       |
| H. — Épineux transversaires ( <i>Multifidus-spignæ</i> ).                     | R <sup>1</sup> . — Sacro-coccygien inférieur ( <i>Lombo-sous-caudien</i> ).        |
| I. — Splénus de la tête ( <i>Cervico-mastoidien</i> ).                        | T. — Inter-épineux supérieur ( <i>Lombo-sacro-coccygien</i> ).                     |
| L. — Grand Complexus ( <i>Dorso-occipitien</i> ).                             | U. — Iléo-sous-caudien ( <i>Iléo-coccygien</i> ).                                  |
| L <sup>1</sup> . — Petit Complexus ( <i>Trachélo-occipitien</i> ).            | X. — Pubo-sous-caudien ( <i>Pubo-coccygien</i> ).                                  |
| M. — Grand Droit antérieur ( <i>Trachélo-sous-occipitien</i> ).               |  |
| M <sup>1</sup> . — Petit Droit antérieur ( <i>Trachéli-sous-occipitien</i> ). |  |
| M <sup>2</sup> . — Grand Droit postérieur ( <i>Axoido-occipitien</i> ).       |  |

### 4° *Muscles du tronc ou des côtes.*

(Pl. 218, 219, fig. 1; — 221, fig. 2 et 3; — 225, fig. 1 et 3.)

- |   |  |
|---|--|
| 6. — Scalène: portion extérieure ou inférieure ( <i>Trachélo-costien</i> ).               | 12. — Triangulaire du sternum ( <i>Sterno-costien</i> ).           |
| 6 <sup>b</sup> . — Scalène: portion intérieure ou supérieure ( <i>Trachélo-costien</i> ). | 13. — Grand Oblique ( <i>Costo-abdominien</i> ).                   |
| 9. — Releveur des côtes ( <i>Transverso-costien</i> ).                                    | 14. — Petit Oblique ou Oblique interne ( <i>Iléo-abdominien</i> ). |
| 10. — Petit Dentelé supérieur ou antérieur ( <i>Dorso-costien</i> ).                      | 15. — Droits du bas-ventre ( <i>Sterno-pubien</i> ).               |
| 11. — P. Dentelé inférieur ou postérieur ( <i>Lombo-costien</i> ).                        | 17. — Tranverse du bas-ventre ( <i>Lombo-abdominien</i> ).         |

### 5° *Muscles du membre antérieur.*

(Pl. 218, 219, 221, 223, 225.)

- |   |   |
|---|---|
| a. — Trapèze ou Cuculaire: portion occipitale       | e. — Omo-hyoïdien.  |
| a <sup>1</sup> . — — — — — portion cervicale        | g. — Grand Dentelé ( <i>Scapulo-costien</i> ).                    |
| a <sup>2</sup> . — — — — — portion dorsale          | h. — Sous-Clavier ( <i>Costo-clavien</i> ).                       |
| b. — Sterno-mastoïdien ou trachélien.               | i. — Grand Dorsal.  |
| b <sup>1</sup> . — Cléïdo-mastoïdien ou trachélien. | j. — Grand Pectoral ( <i>Sterno-humérien</i> ): portion sternale. |
| c. — Rhomboïde de la tête                           | j <sup>1</sup> . — — — — — portion costale et même                |
| c <sup>1</sup> . — — — — — du cou                   | ventrale.   |
| c <sup>2</sup> . — — — — — du dos                   | j <sup>2</sup> . — — — — — portion profonde, dite                 |
| d. — Omo ou Acromio-trachélien.                     | Moyen ou P. Pectoral.   |

## MYOLOGIE DU CASTOR.

- k. — Deltoïde (*Sous-acromio-humérien*) : portion claviculaire.
- k<sup>1</sup>. — — — — — portion scapulaire.
- l. — Sur-épineux (*Sus-scapulo-trochitérien*).
- m. — Sous-épineux (*Sous-scapulo-trochitérien*).
- n. — Sous-scapulaire (*Scapulo-trochinien*).
- o. — Grand Rond (*Scapulo-humérien*).
- q. — Coraco-brachial (*Coraco-humérien*).
- r. — Biceps ou Long Fléchisseur de l'avant-bras } (*Scapulo-*  
— — — — — portion coracoïdienne } *radien*).
- r<sup>1</sup>. — — — — — portion bicipitale }
- s. — Brachial interne ou Court Fléchisseur (*Huméro-cubiten*).
- t. — Triceps (*Scapulo-olécranien*) : portion scapulaire.
- t<sup>1</sup>. — — — — — portion humérale externe.
- t<sup>2</sup>. — — — — — portion humérale interne.
- +t.<sup>2</sup> — — — — — portion humérale accessoire.
- x. — Rond Pronateur (*Épitrochlo-radien*).
- α. — Palmaire grêle (*Épitrochlo-palmaire*).
- β. — Cubital interne (*Épitrochlo-carpien*).
- β<sup>1</sup>. — — — — — externe (*Cubito-sus-métacarpien*).
- γ. — Radial interne (*Épitrochlo-métacarpien*).
- δ. — 1<sup>er</sup> Radial externe (*Huméro-sus-métacarpien*).
- δ<sup>1</sup>. — 2<sup>e</sup> Radial externe (*Épicondylo-sus-métacarpien*)<sup>1</sup>.
- ε. — Extenseur commun (*Épicondylo-sus-phalangetien*).
- ε<sup>1</sup>. — — — — — propre du petit doigt (*Id. du petit doigt*).
- ε<sup>2</sup>. — — — — — propre de l'index (*Cubito-sus-phalangettien de l'index*).
- ζ. — Long Extenseur du pouce (*Cubito-sus-phalangettien du pouce*).
- η. — Long Abducteur du pouce (*Cubito-sus-métacarpien*).
- κ. — Fléchisseur sublime (*Épitrochlo-phalanginien*).
- μ. — Fléchiss. profond : portion radiale } (*Cubito-sous-*  
μ<sup>1</sup>. — — — — — portion humérale } *onguien*).
- μ<sup>2</sup>. — — — — — portion cubitale }
- ξ. — Court Abducteur du pouce (*Carpo-sus-phalangien*).
- υ. — Abducteur du petit doigt (*Carpo-phalangien*).
- φ. — Lombricaux (*palmo-phalangien*).
- χ. — Inter-osseux supér. ou externes } (*Métacarpo-sus-*  
χ<sup>1</sup>. — Inter-osseux infér. ou internes } *phalangiens*).

6° *Muscles du membre postérieur.*

(Pl. 219, fig. 1; — 220, 222, 224, 225, 226.)

- a. — Grand Fessier (*Sacro-fémorien*).  
a<sup>1</sup>. — Moyen Fessier (*Ilio-trochantérien*).  
a<sup>2</sup>. — Petit Fessier (*Ilii-trochantérien*).  
b. — Carré de la cuisse (*Ischio-trochantérien*).  
d. — Obturateur externe (*Sous-pubio-trochantérien*).  
c. — Jumeau supérieur (*Ischii-trochantérien*).  
g. — Petit Psoas (*Prélombo-pubien*).  
h. — Grand Psoas (*Prélombo-trochantinien*).  
i. — Iliaque (*Ilio-trochantinien*).  
k. — Premier Pectiné }  
k<sup>1</sup>. — Deuxième Pectiné } (*Pubo-fémorien*).  
k<sup>2</sup>. — Troisième Pectiné }  
l. — Premier ou Court Adducteur (*Sous-pubo-fémorien*).  
l<sup>1</sup>. — Deuxième ou Moyen Adducteur (*S.-pubi-fémorien*).  
l<sup>2</sup>. — Troisième ou Long Adducteur (*Ischii-fémorien*).  
m. — Vaste externe }  
n. — Vaste interne } (*Trifémoro-rotulien*).  
o. — Crural }  
p. — Grêle ou Droit antérieur ou 4<sup>e</sup> Extenseur (*Iléo-rotulien*).  
q. — Biceps (*Ischio-péronien*).  
+q. — — — — — portion coccygienne.  
r. — Demi-nerveux ou Demi-tendineux (*Ischio-prétibien*).  
s. — Demi-membraneux (*Ischio-sous-tibien*).
- u. — Grêle ou Droit interne (*Pubio-prétibien*).  
v. — Poplité (*Poplito-tibien*).  
α. — Gastro-cnémien externe } (*Bi-fémoro-calcanien*).  
α<sup>1</sup>. — — — interne }  
β. — Soléaire (*Tibio-calcanien*).  
γ. — Plantaire grêle (*Fémoro-calcanien*).  
δ. — Tibia ou Jambier antérieur (*Tibio-sus-tarsien*).  
ζ<sup>2</sup>. — — — — — postérieur (*Tibio-sous-tarsien*).  
ε. — Long Péronier (*Péronéo-sous-métatarsien*).  
ε<sup>1</sup>. — Moyen Péronier (*Péronéo-sus-métatarsien*).  
ε<sup>2</sup>. — Court Péronier (*Péronéi-sus-métatarsien*).  
ζ. — Long Extenseur commun (*Péronéo-sus-onguien*).  
ζ<sup>1</sup>. — — — — — du pouce (*Péronéi-sus-onguien*).  
η. — Court Extenseur commun ou Pédieux (*Calcanéo-sus-onguien*).  
ι. — Long Fléchisseur commun (*Tibio-sous-onguien*).  
ι<sup>1</sup>. — — — — — du pouce (*Tarso-phalangien*).  
λ. — Court Fléchisseur du pouce (*Tarso-phalangien du pouce*).  
λ<sup>2</sup>. — Court Fléchisseur du petit doigt (*Tarso-phalangien du petit orteil*).  
ο. — Chair carrée ou accessoire du fléchisseur commun.  
π. — Lombricaux (*Plantis-sous-phalangiens*).  
ρ. — Inter-osseux (*Métatarso-phalangiens latéraux*).

7° *Diverses autres parties.*

(Pl. 218, 220.)

- |   |   |
|---|---|
| <p> <math>\mathfrak{N}</math>. — Testicule.<br/> <math>\mathcal{O}</math>. — Crémaster.<br/> <math>\mathcal{P}</math>. — Ischio-caverneux.<br/> <math>\mathfrak{Q}</math>. — Constricteur de l'anus. </p> | <p> <math>+</math>. — Ligne blanche.<br/> <math>\dagger</math>. — Ombligo.<br/> <math>\pm</math>. — Fibres musculaires épanouies sur la poche<sup>2</sup>. </p> |
|---|---|

1. « Il existe un Court Supinateur qui est caché par les radiaux ». (Note de M. Cuvier, pl. 223, fig. 2.)

2. Dans la fig. 1 de la pl. 220, «l'appareil des bourses du Castoréum est rejeté et vu de côté; ces bourses sont enveloppées par une expansion du bulbo-caverneux qui forme une poche particulière pour chacune». (Note de M. Cuvier.)



Muscle peaucier.  
 $\frac{1}{2}$














Fig. 1.

Face interne et superficielle  
de la cuisse et des lombes.

$\frac{1}{2}$




Fig. 2.

Face interne de la cuisse  
2<sup>me</sup> couche.

$\frac{1}{2}$








Fig. 1.

Face antérieure superficielle  
et profonde de l'épaule.  
gr. nat.




Fig. 2.

Face antérieure et  
profonde du cou.  
 $\frac{1}{2}$



Fig. 3.

Face interne de la paroi  
thoracique antérieure.






Fig. 2.

Face externe de la jambe droite  
gr. nat.



Fig. 1.

Face interne de la jambe droite  
gr. nat.









Fig. 2.  
Face inférieure  
dupied droit.




Fig. 1  
Face postérieure de la jambe et  
du pied gauches, couche profonde  
gr. nat.












Fig. 5.

Face latérale  
de la queue.




Fig. 2.

Face inférieure  
de la queue.



Fig. 1.

Face supérieure  
de la queue.





# MYOLOGIE DU PORC-ÉPIC

(*HYSTRIX CRISTATA*, L., Cuv., *Rég. an.*, t. I, p. 208).

## INDICATION DES MUSCLES.

### 1° *Muscles peauciers.*

(Pl. 227 — 228 — 231, fig. 1.)

Le développement des muscles Peauciers à la face dorsale du corps est un des traits remarquables de cette myologie; il est curieux de la comparer à celles du hérisson, du tenrec, du rat-taupe.

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 2. — Facien.         | 5 <sup>a</sup> . — Portion scapulaire. |
| 3. — Cérvico-facien. | 5 <sup>c</sup> . — latérale.           |
| 4. — Thoraco-facien. | 5 <sup>d</sup> . — ventrale.           |
| 5. — Dermo-humérien. |  |

### 2° *Muscles de la face et de l'os hyoïde.*

(Pl. 229.)

x. — Sterno-hyoïdien.

### 3° *Muscles de l'épine.*

(Pl. 227 — 230, fig. 1 et 2; — 231, fig. 3.)

- |   |   |
|---|---|
| A. — Epineux du dos ou Tendino-épineux, détaché des tendons du Long dorsal et rejeté.   | C. — Sacro-lombaire.  |
| B. — Long dorsal, dont on voit en haut les aponévroses et les tendons. « Les lignes ponctuées indiquent les limites de l'attache du Tendino-épineux au Long dorsal; en avant il se détache, de ce dernier muscle, trois tendons articulaires; le plus antérieur se bifurque et envoie une lanière au Demi-épineux; plus haut on aperçoit les tendons articulaires d'où naissent trois lames longitudinales, allant aux mêmes apophyses que le Tendino-épineux, et qui se terminent par des languettes successives aux apophyses épineuses du cou. Il s'y joint une branche du premier tendon articulaire du Long dorsal, et une qui naît près du Digastrique; du troisième naît une languette qui va à la première lame du Transversaire du cou. » (Note de G. Cuvier.) | E. — Demi-épineux du cou.   |
|   | H. — Epineux transversaire ou <i>Multifidus spinae</i> .                            |
|   | I. — Splénus de la tête ( <i>Cervico-mastoïdien</i> ).                              |
|   | I'. — Splénus du cou ( <i>Dorso-trachélien</i> ).                                   |
|   | K. — Digastrique du cou ( <i>Dorso-occipitien</i> ). Il est uni au Grand complexus. |
|   | L. — Grand complexus ( <i>Trachélo-occipitien</i> ).                                |
|   | L'. — Petit complexus ( <i>Trachélo-mastoïdien</i> ).                               |
|   | M. — Grand droit antérieur ( <i>Trachélo-sous-occipitien</i> ).                     |
|   | M <sup>2</sup> . — Grand droit postérieur ( <i>Axoïdo-occipitien</i> ).             |
|   | N. — Petit oblique ou Oblique supérieur ( <i>Atloïdo-post-mastoïdien</i> ).         |
|   | N'. — Grand oblique ou Oblique inférieur ( <i>Axoïdo-Atloïdien</i> ).               |
|   | P. — Carré des lombes.  |
|   | Q. — Ischio-caudien ( <i>Ischio-cocegygien-externe</i> ).                           |

### 4° *Muscles du tronc et des côtes.*

(Pl. 227 — 229, fig. 1; — 230, fig. 1 et 2.)

- |  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| 6. — Scalène, portion extérieure ou inférieure                       | } ( <i>Trachélo-costien</i> ). | 11. — P. dentelé inférieur ou postérieur ( <i>Lombo-costien</i> ). |
| 6 <sup>a</sup> . — portion moyenne                                   |                                | 13. — Grand oblique ( <i>Costo-abdominien</i> ).                   |
| 6 <sup>b</sup> . — portion intér. ou supér.                          |                                | 14. — Petit oblique ou Oblique interne ( <i>Iléo-abdominien</i> ). |
| 10. — Petit dentelé supérieur ou antérieur ( <i>Dorso-costien</i> ). |                                | 15. — Droits du bas-ventre ( <i>Sterno-pubiens</i> ).              |
|  |                                | 18. — Triangulaire du sternum ( <i>Sterno-costien</i> ).           |

### 5° *Muscles du membre antérieur.*

(Pl. 227 — 228 — 229, fig. 1 et 2; — 250, fig. 1; — 231, fig. 1 et 2.)

Les muscles de la main et de l'avant-bras ont un développement assez considérable qui est en rapport avec les habitudes d'un animal fouisseur et non coureur. La même observation s'appliquerait au membre postérieur.

- |   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| a. — Trapèze ou Cuculaire, portion allant de la clavicule à l'occipital | } ( <i>Dorso-sus-acromien</i> ). | b. — Sterno-mastoïdien ou trachélien.  |
| a'. — <i>Idem</i> , portion cervicale                                   |                                  | b'. — Cléïdo-mastoïdien ou trachélien. |
| a <sup>2</sup> . — <i>Idem</i> , portion dorsale                        |                                  | c. — Rhomboïde de la tête              |
|   |                                  | c'. — Rhomboïde du cou                 |
- (portion du *Dorso-trachélien*).

# MYOLOGIE DU PORC-ÉPIC.


- d. — Omo ou Acromio-trachélien.  
d'. — Releveur ou Angulaire de l'omoplate (*Trachélo-scapulien*).  
g. — Grand dentelé (*Scapulo-costien*).  
h. — Sous-clavier (*Costo-clavien*).  
i. — Grand dorsal.  
j. — Grand pectoral, portion sternale (*Sterno-humérien*).  
j<sup>1</sup>. — Grand pectoral, portion costale et même ventrale.  
j<sup>2</sup>. — *Idem*, portion profonde dite Moyen ou Petit pectoral.  
k. — Deltoïde (*Sous-acromio-humérien*), portion claviculaire.  
k<sup>1</sup>. — Deltoïde, portion scapulaire.  
l. — Sur-épineux (*Sus-scapulo-trochitérien*).  
m. — Sous-épineux (*Sous-scapulo-trochitérien*).  
n. — Sous-scapulaire (*Scapulo-trochinien*).  
o. — Grand rond (*Scapulo-humérien*).  
q. — Coraco-brachial (*Coraco-humérien*).  
r. — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras (*Scapulo-radial*), portion coracoïdienne.  
r<sup>1</sup>. — *Idem*, portion bicipitale.  
s. — Brachial interne ou Court fléchisseur (*Huméro-cubital*).  
t. — Triceps (*Scapulo-olécrânien*), portion scapulaire.  
t<sup>1</sup>. — *Idem*, portion humérale externe.  
t<sup>2</sup>. — Triceps, portion humérale interne.  
t<sup>3</sup>. — *Idem*, portion allant au tendon du Grand dorsal, dite 4<sup>e</sup> Extenseur.  
v. — Long supinateur (*Huméro-sus-radial*).  
x. — Rond pronateur (*Épitrochlo-radial*).  
x<sup>1</sup>. — Carré pronateur (*Cubito-radial*).  
z. — Palmaire grêle (*Épitrochlo-palmaire*).  
z<sup>1</sup>. — Cubital interne (*Épitrochlo-carpien*).  
z<sup>2</sup>. — — externe ou postérieur (*Cubito-sus-métacarpien*).  
z<sup>3</sup>. — 1<sup>er</sup> Radial externe (*Huméro-sus-métacarpien*).  
z<sup>4</sup>. — 2<sup>e</sup> Radial externe (*Épicondylo-sus-métacarpien*).  
z<sup>5</sup>. — Extenseur commun (*Épicondylo-sus-phalangien*).  
z<sup>6</sup>. — — propre du petit doigt (*Id. du petit doigt*).  
z<sup>7</sup>. — — propre de l'index (*Cubito-sus-phalangien de l'index*).  
z<sup>8</sup>. — Long abducteur du pouce (*Cubito-sus-métacarpien*).  
z<sup>9</sup>. — Fléchisseur sublime (*Épitrochlo-phalangien*).  
z<sup>10</sup>. — Fléchisseur profond, portion radiale (portion du *Cubito-sous-onguien*).  
z<sup>11</sup>. — Court abducteur du pouce (*Campo-sus-phalangien*).  
z<sup>12</sup>. — Court fléchisseur du petit doigt (*Campo-métacarpien*).  
z<sup>13</sup>. — Abducteur du petit doigt (*Campo-phalangien*).  
z<sup>14</sup>. — Inter-osseux inférieurs ou internes (portion interne des *Métacampo-sus-phalangiens*).

## 6<sup>e</sup> Muscles du membre postérieur.

(Pl. 227 — 229, fig. 1 et 3; — 231, fig. 3 et 4.)

- a. — Grand fessier (*Sacro-fémorien*).  
a<sup>1</sup>. — Moyen fessier (*Ilio-trochantérien*).  
b. — Carré de la cuisse (*Ischio-trochantérien*).  
c. — Obturateur interne (*Sous-pubio-trochantérien interne*).  
e. — Jumeau supérieur } (*Ischii-trochantériens*).  
e<sup>1</sup>. — Jumeau inférieur }  
g. — Petit psoas (*Prélombo-pubien*).  
h. — Grand psoas (*Prélombo-trochantinien*).  
i. — Iliaque (*Ilio-trochantinien*).  
k. — 1<sup>er</sup> Pectiné } (portion des *pubo-fémoriens*).  
k<sup>1</sup>. — 2<sup>e</sup> Pectiné }  
l. — 1<sup>er</sup> ou Court adducteur (*Sous-pubo-fémorien*).  
l<sup>1</sup>. — 2<sup>e</sup> ou Moyen adducteur (*Sous-pubi-fémorien*).  
l<sup>2</sup>. — 3<sup>e</sup> ou Long adducteur (*Ischii-fémorien*).  
m. — Vaste externe } (portion du *Trifémoro-rotulien*).  
n. — Vaste interne }  
p. — Grêle ou Droit antérieur, ou 4<sup>e</sup> Extenseur (*Iléo-rotulien*).  
q<sup>1</sup>. — Portion fémorale du Biceps (*Ischio-péronien*).  
+q. — Fémoro-coccygien (G. Cuvier).  
r. — Demi-nerveux ou tendineux (*Ischio-prétibien*).  
s. — Demi-membraneux (*Ischio-sous-tibien*).  
t. — Couturier (*Iléo-prétibien*).  
u. — Grêle ou Droit interne (*Pubio-prétibien*).  
v. — Poplité (*Poplito-tibien*).  
x. — Fascia lata (*Iléo-fascien*).  
z. — Gastro-cnémien externe } (*Bi-fémoro-calcanien*).  
z<sup>1</sup>. — — interne }  
z<sup>2</sup>. — Soléaire (*Tibio-calcanien*).  
z<sup>3</sup>. — Plantaire grêle (*Fémoro-calcanien*).  
z<sup>4</sup>. — Tibial ou Jambier antérieur (*Tibio-sus-tarsien*).  
z<sup>5</sup>. — — postérieur (*Tibio-sous-tarsien*).  
z<sup>6</sup>. — Long péronier (*Péronéo-sous-tarsien*).  
z<sup>7</sup>. — Moyen péronier (*Péronéo-sus-métatarsien*).  
z<sup>8</sup>. — Court péronier (*Péronéo-sus-métatarsien*).  
z<sup>9</sup>. — Long extenseur commun (*Péronéo-sus-onguien*).  
z<sup>10</sup>. — Court extenseur commun ou Pédieux (*Calcanéo-sus-onguien*).  
z<sup>11</sup>. — Long fléchisseur commun (*Tibio-sous-onguien*).  
z<sup>12</sup>. — — du pouce (*Tarso-phalangien*).  
z<sup>13</sup>. — Court fléchisseur commun (*Calcanéo-sous-onguien*).  
z<sup>14</sup>. — Court abducteur du pouce.  
z<sup>15</sup>. — Erecteur du pénis (G. Cuvier).

AD. FOCHLON.



















Fig. 2.  
Muscles de l'épine,  
couche profonde.




Fig. 1.  
Muscles de l'épine,  
1<sup>re</sup> couche.






Fig. 1.  
Membre antérieur  
gauche  
face interne.




Fig. 4.  
Jambe gauche  
face postérieure  
couche profonde




Fig. 2.  
Couche profonde  
de la main.




Fig. 5.  
Membre postérieure  
gauche  
face interne





# MYOLOGIE DU LAPIN

(LEPUS CUNICULUS, L., Cuv., *Rég. an.*, t. I, p. 210).

## INDICATION DES MUSCLES.

Cette myologie offre un type intéressant d'un animal rapide à la course; c'est surtout sur la myologie de l'épaule et du bras, du bassin et de la cuisse, qu'il est utile de porter son attention.

### 1° Muscles de la peau.

(Pl. 233 — 234, fig. 2.)

5° — Muscle peaucier, portion latérale.

### 2° Muscles de la face et de l'os hyoïde.

(Pl. 232 — 233 — 235, fig. 1 et 4.)

b. — Temporal ou Crotaphyte.	p <sup>1</sup> . — Ptérygoïdien interne.
c. — Releveur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure.	q. — Digastrique.
g. — Élévateur propre de la lèvre supérieure.	r. — Mylo-hyoïdien.
h. — Petit zygomatique.	s. — Stylo-hyoïdien.
j. — Masseter.	x. — Sterno-hyoïdien.
k. — Buccinateur.	x <sup>1</sup> . — Sterno-thyroïdien.
n. — Carré du menton ou Abaisseur de la lèvre inférieure.	y. — Thyro-hyoïdien.

### 3° Muscles de l'oreille.

(Pl. 232 — 235, fig. 4.)

La myologie de l'oreille, dans le lapin, est un des types que G. Cuvier a choisis pour la description de cette partie dans son *Anatomie comparée*, 2<sup>e</sup> édition, tome III, page 553.

Λ. — Vertico-scutien.	π <sup>2</sup> . — Occipiti-aurien.
Λ <sup>1</sup> . — Jugo-scutien.	π <sup>3</sup> . — Occipiti-aurien rotateur.
Λ <sup>2</sup> . — Cervico-scutien.	γ <sup>2</sup> . — Jugo-aurien profond.
Π. — Surcili-aurien.	φ. — Scutien antérieur.
π <sup>1</sup> . — Cervici-aurien.	φ <sup>2</sup> . — Scutien rotateur.

### 4° Muscles de l'épine.

(Pl. 232 — 233 — 234, fig. 1; — 235, fig. 1, 2, 3; — 236, fig. 3.)

A. — Épineux du dos ou Tendino-épineux. « Les lames de ce muscle sont formées, supérieurement de fibres qui adhèrent au Long dorsal, profondément de fibres qui viennent de tendons adhérant aux apophyses articulaires de vertèbres assez reculées. » (Note de G. Cuvier.)	F. — Splénus du cou ( <i>Dorso-trachélien</i> ).
B. — Long dorsal.	K. — Digastrique du cou ( <i>Dorso-occipitien</i> ).
C. — Sacro-lombaire.	L. — Grand complexe ( <i>Trachélo-occipitien</i> ).
D <sup>1</sup> . — Transversaire grêle ou Cervical descendant.	L <sup>1</sup> . — Petit complexe ( <i>Trachélo-mastôïdien</i> ).
E. — Demi-épineux du cou.	M. — Grand droit antérieur ( <i>Trachélo-sous-occipitien</i> ).
G. — Inter-épineux. « C'est une lame très-mince. » (Note de G. Cuvier.)	M <sup>2</sup> . — Grand droit postérieur ( <i>Axoïdo-occipitien</i> ).
I. — Splénus de la tête ( <i>Cervico-mastôïdien</i> ).	M <sup>3</sup> . — Petit droit postérieur ( <i>Atloïdo-occipitien</i> ).
	N. — Petit oblique ou Oblique supérieur ( <i>Atloïdo-post-mastôïdien</i> ).
	N <sup>1</sup> . — Grand oblique ou Oblique inférieur ( <i>Axoïdo-atloïdien</i> ).
	O. — Long antérieur du cou ( <i>Prédorso-atloïdien</i> ).
	Q. — Ischio-caudien ( <i>Ischio-coccygien-externe</i> ).

### 5° Muscles du tronc et des côtes.

(Pl. 232 — 233 — 235, fig. 1 et 2; — 236, fig. 5.)

6. — Scalène, portion extér. ou inférieure	} ( <i>Trachélo-costien</i> ).	13. — Grand oblique ( <i>Costo-abdominien</i> ).
6 <sup>a</sup> . — — — moyenne —		14. — Petit oblique ou Oblique interne ( <i>Iléo-abdominien</i> ).
6 <sup>b</sup> . — — — intér. ou supér.		15. — Droits du bas-ventre ( <i>Sterno-pubiens</i> ).
11. — Petit dentelé inférieur ou postérieur ( <i>Lombo-costien</i> ).		

## MYOLOGIE DU LAPIN.

### 6° Muscles du membre antérieur.

(Pl. 232 — 233 — 234, fig. 1, 2, 3.)

- |   |   |
|---|---|
| <p>a. — Trapèze ou Cuculaire, portion occipitale</p> <p>a<sup>1</sup>. — <i>Idem</i>, portion cervicale</p> <p>a<sup>2</sup>. — <i>Idem</i>, portion dorsale</p> <p>b. — Sterno-mastoïdien ou trachélien.</p> <p>b<sup>1</sup>. — Cléido-mastoïdien ou trachélien.</p> <p>+b<sup>1</sup>. — Cléido-basilaire.</p> <p>c. — Rhomboïde de la tête</p> <p>c<sup>1</sup>. — — du cou</p> <p>c<sup>2</sup>. — — du dos</p> <p>d. — Omo ou Acromio-trachélien, Acromio-basilaire. (G. Cuvier.)</p> <p>g. — Grand dentelé trachélien</p> <p>g<sup>1</sup>. — Grand dentelé costal</p> <p>h. — Sous-clavier (<i>Costo-clavier</i>).</p> <p>i. — Grand dorsal.</p> <p>j. — Grand pectoral, portion sternale (<i>Sterno-humérien</i>).</p> <p>j<sup>1</sup>. — <i>Idem</i>, portion costale ou même ventrale.</p> <p>j<sup>2</sup>. — <i>Idem</i>, portion profonde, dite Moyen ou Petit pectoral.</p> <p>k. — Deltoïde (<i>Sous-acromio-humérien</i>), portion claviculaire.</p> <p>k<sup>1</sup>. — Deltoïde, portion scapulaire.</p> <p>l. — Sur-épineux (<i>Sus-scapulo-trochitérien</i>).</p> | <p>m. — Sous-épineux (<i>Sous-scapulo-trochitérien</i>).</p> <p>n. — Sous-scapulaire (<i>Scapulo-trochinien</i>).</p> <p>o. — Grand rond (<i>Scapulo-humérien</i>).</p> <p>q. — Coraco-brachial (<i>Coraco-humérien</i>).</p> <p>r. — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras (<i>Scapulo-radial</i>), portion coracoïdienne.</p> <p>s. — Brachial interne ou Court fléchisseur (<i>Huméro-cubitalien</i>).</p> <p>t. — Triceps (<i>Scapulo-olécranien</i>), portion scapulaire.</p> <p>t<sup>1</sup>. — <i>Idem</i>, portion humérale externe.</p> <p>t<sup>2</sup>. — <i>Idem</i>, portion humérale interne.</p> <p>t<sup>3</sup>. — <i>Idem</i>, portion allant au tendon du Grand dorsal, dite 4<sup>e</sup> Extenseur.</p> <p>x. — Rond pronateur (<i>Épitrochlo-radial</i>).</p> <p>ε. — Cubital interne (<i>Épitrochlo-carpien</i>).</p> <p>ε<sup>1</sup>. — — externe (<i>Cubito-sus-métacarpien</i>).</p> <p>γ. — Radial interne (<i>Épitrochlo-métacarpien</i>).</p> <p>δ. — 1<sup>er</sup> Radial externe (<i>Huméro-sus-métacarpien</i>).</p> <p>ε. — Extenseur commun (<i>Épicondilo-sus-phalangien</i>).</p> <p>ε<sup>1</sup>. — — propre du petit doigt (<i>Id. du petit doigt</i>).</p> <p>ι. — Long abducteur du pouce (<i>Cubito-sus-métacarpien</i>).</p> <p>κ. — Fléchisseur sublime (<i>Épitrochlo-phalangien</i>).</p> <p>μ. — Fléchisseur profond, portion radiale (portion du <i>Cubito-sous-onguien</i>).</p> |
|---|---|

### 7° Muscles du membre postérieur.

(Pl. 232 — 236, fig. 1, 2, 3, 4, 5.)

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. — Grand fessier (<i>Sacro-fémorien</i>).</p> <p>a<sup>1</sup>. — Moyen fessier (<i>Ilio-trochantérien</i>).</p> <p>a<sup>2</sup>. — Petit fessier (<i>Ilii-trochantérien</i>).</p> <p>b. — Carré de la cuisse (<i>Ischio-trochantérien</i>).</p> <p>c. — Obturateur interne (<i>Sous-pubio-trochantérien interne</i>).</p> <p>d. — Obturateur externe (<i>Sous-pubio-trochantérien externe</i>).</p> <p>e. — Jumeau supérieur</p> <p>e<sup>1</sup>. — Jumeau inférieur</p> <p>g. — Petit psoas (<i>Prélombo-pubien</i>).</p> <p>h. — Grand psoas (<i>Prélombo-trochantinien</i>).</p> <p>i. — Iliaque (<i>Ilio-trochantinien</i>).</p> <p>k. — 1<sup>er</sup> Pectiné (portion du <i>Pubo-fémorien</i>).</p> <p>l. — 1<sup>er</sup> ou Court adducteur (<i>Sous-pubo-fémorien</i>).</p> <p>l<sup>1</sup>. — 2<sup>e</sup> ou Moyen adducteur (<i>Sous-pubi-fémorien</i>).</p> <p>l<sup>2</sup>. — 3<sup>e</sup> ou Long adducteur (<i>Ischii-fémorien</i>).</p> <p>m. — Vaste externe</p> <p>n. — Vaste interne</p> <p>o. — Crural</p> | <p>p. — Grêle ou Droit antérieur, ou 4<sup>e</sup> Extenseur (<i>Ileo-rotulien</i>).</p> <p>q. — Biceps (<i>Ischio-péronien</i>).</p> <p>+q. — Accessoire coccygien du Biceps.</p> <p>r. — Demi-nerveux ou tendineux (<i>Ischio-prétibien</i>).</p> <p>+r. — Accessoire coccygien du Demi-nerveux.</p> <p>s. — Demi-membraneux (<i>Ischio-sous-tibien</i>).</p> <p>+s. — Ischio-tibien grêle.</p> <p>t. — Couturier (<i>Ilio-prétibien</i>).</p> <p>u. — Grêle ou Droit interne (<i>Pubio-prétibien</i>).</p> <p>x. — Fascia lata (<i>Ileo-fascien</i>).</p> <p>α. — Gastro-cnémien externe</p> <p>α<sup>1</sup>. — — interne</p> <p>ε. — Soléaire (<i>Tibio-calcaneien</i>).</p> <p>γ. — Plantaire grêle (<i>Fémoro-calcaneien</i>).</p> <p>δ. — Tibial ou Jambier antérieur (<i>Tibio-sus-tarsien</i>).</p> <p>δ<sup>1</sup>. — — postérieur (<i>Tibio-sous-tarsien</i>).</p> <p>ε. — Long péronier (<i>Péronéo-sous-tarsien</i>).</p> <p>ζ. — Long extenseur commun (<i>Péronéo-sus-onguien</i>).</p> <p>ι. — Long fléchisseur commun (<i>Tibio-sous-onguien</i>).</p> <p>ι<sup>1</sup>. — — du pouce (<i>Tarso-phalangien</i>).</p> |
|--|---|

AN. FOCILLON.

Face latérale  
1<sup>re</sup> couche.









Fig. 1  
Muscles de l'épaule  
2<sup>e</sup> couche




Fig. 3.  
Membre antérieur  
face interne.



Fig. 2.  
Muscles de l'épaule  
face interne.








Fig. 1

Muscles de l'épaule,  
3<sup>e</sup> couche.




Fig. 2.

Muscles de l'épine,  
1<sup>ère</sup> couche.




Fig. 3.

Muscles de l'épine,  
2<sup>e</sup> couche.



Fig. 4.

Muscles de l'oreilles,  
1<sup>re</sup> et 2<sup>me</sup> couche.






Fig. 1.

Face externe  
de la cuisse  
1<sup>re</sup> couche.




Fig. 2.

Face externe  
de la cuisse  
2<sup>e</sup> couche.




Fig. 3.

Face externe  
de la cuisse  
3<sup>e</sup> couche





Fig. 4.

Face interne  
de la cuisse  
1<sup>re</sup> couche.



Fig. 5.

Face interne  
de la cuisse  
2<sup>e</sup> couche.





# MYOLOGIE DU COCHON D'INDE

(Mus PORCELLUS, L., Cuv., *Règ. an.*, p. 213).

## INDICATION DES MUSCLES.

### 1° Muscles de la peau.

(Pl. 237, fig. 1; — 238, fig. 1.)

4. — Thoraco-facien.  
5<sup>a</sup>. — Portion scapulaire.  
5<sup>b</sup>. — dorsale.

- 5<sup>c</sup>. — Portion latérale.  
5<sup>d</sup>. — ventrale.

### 2° Muscles de la face et de l'os hyoïde.

(Pl. 238, fig. 1 et 2.)

- j. — Masseter.  
q. — Digastrique.

- +. — Sterno-basilaire.

### 3° Muscles de l'épine.

(Pl. 237, fig. 2; — 238, fig. 2; — 239, fig. 1, 2, 3.)

- A. — Epineux du dos ou Tendino-épineux.  
B. — Long dorsal.  
C. — Sacro-lombaire.  
E. — Demi-épineux du cou.  
F. — Inter-transversaires.  
H. — Epineux transversaires ou *Multifidus spinae*.  
I'. — Splénus du cou (*Dorso-trachélien*).  
K. — Digastrique du cou (*Dorso-occipitien*).

- L. — Grand complexe (*Trachélo-occipitien*).  
L'. — Petit complexe (*Trachélo-mastoïdien*).  
M. — Grand droit antérieur (*Trachélo-sous-occipitien*).  
M<sup>2</sup>. — Grand droit postérieur (*Axôido-occipitien*).  
N. — Petit oblique ou Oblique supérieur (*Atloïdo-post-mastoïdien*).  
N'. — Grand oblique ou Oblique inférieur (*Axôido-atloïdien*).

### 4° Muscles du tronc et des côtes.

(Pl. 237, fig. 2; — 238, fig. 1 et 2; — 239, fig. 1 et 2.)

6. — Scalène, portion extér. ou inférieure }  
6<sup>a</sup>. — — moyenne } (*Trachélo-*  
6<sup>b</sup>. — — intér. ou supérieure } *costien*).  
10. — Petit dentelé supérieur ou antérieur (*Dorso-cos-*  
*tien*).

11. — Petit dentelé inférieur ou postérieur (*Lombo-*  
*costien*).  
13. — Grand oblique (*Costo-abdominien*).  
15. — Droits du bas-ventre (*Sterno-pubiens*).

### 5° Muscles du membre antérieur.

(Pl. 237, fig. 2; — 238, fig. 1; — 239, fig. 1.)

- a. — Trapèze ou Cucullaire, portion occi-  
pitale }  
a<sup>1</sup>. — *Idem*, portion cervicale } (*Dorso-sus-*  
a<sup>2</sup>. — *Idem*, portion dorsale } *acromien*).  
b. — Sterno-mastoïdien ou trachélien.  
b<sup>1</sup>. — Cléïdo-trapèze.  
d. — Omo ou Acromio-trachélien.  
g. — Grand dentelé (*Scapulo-costien*).  
h. — Sous-clavier (*Costo-clavien*).  
i. — Grand dorsal.  
j. — Grand pectoral, portion sternale (*Sterno-humé-*  
*rien*).  
j<sup>1</sup>. — *Idem*, portion costale et même ventrale.  
j<sup>2</sup>. — *Idem*, portion profonde dite Moyen ou Petit pec-  
toral.  
k. — Deltoïde (*Sous-acromio-humérien*), portion clavi-  
culaire.

- k<sup>1</sup>. — *Idem*, portion scapulaire.  
r. — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras (*Scapulo-radial*), portion coracoïdienne.  
s. — Brachial interne ou Court fléchisseur (*Huméro-cubitien*).  
t. — Triceps (*Scapulo-olécranien*), portion scapulaire.  
t<sup>1</sup>. — — portion humérale externe.  
ε. — Cubital interne (*Épitrochlo-carpien*).  
δ. — 1<sup>er</sup> Radial externe (*Huméro-sus-métacarpien*).  
ε. — Extenseur commun (*Épicondylo-sus-phalanget-*  
*tien*).  
ε<sup>1</sup>. — *Idem*, propre du petit doigt (*Id. du petit doigt*).  
ε<sup>2</sup>. — *Idem*, propre de l'index (*Cubito-sus-phalangettien*  
*de l'index*).  
ι. — Long abducteur du ponce (*Cubito-sus-métacar-*  
*prien*).

# MYOLOGIE DU COCHON D'INDE.

## 6<sup>e</sup> Muscles du membre postérieur.

(Pl. 237, fig. 2; — 238, fig. 1 et 2; — 239, fig. 1 et 2.)

- |  |  |
|--|--|
| a. — Grand fessier ( <i>Sacro-fémorien</i> ).  | p. — Grêle ou Droit antérieur, ou 4 <sup>e</sup> Extenseur ( <i>Iléo-rotulien</i> ). |
| a <sup>1</sup> . — Moyen fessier ( <i>Ilio-trochantérien</i> ).  | q. — Biceps ( <i>Ischio-péronien</i> ).  |
| a <sup>2</sup> . — Petit fessier ( <i>Ilii-trochantérien</i> ).  | q <sup>1</sup> . — Sa portion fémorale.  |
| b. — Carré de la cuisse ( <i>Ischio-trochantérien</i> ).   | r. — Demi-nerveux ou tendineux ( <i>Ischio-prétibien</i> ).                          |
| c, e. — Obturateur interne ( <i>Sous-pubio-trochantérien interne</i> ) et Jumeau supérieur (portion des <i>Ischii-trochantériens</i> ) réunis. | s. — Demi-membraneux ( <i>Ischio-sous-tibien</i> ).                                  |
| d. — Obturateur externe ( <i>Sous-pubio-trochantérien externe</i> ).   | t. — Couturier ( <i>Iléo-prétibien</i> ).  |
| f. — Pyramidal ( <i>Sacro-trochantérien</i> ).   | u. — Grêle ou Droit interne ( <i>Pubio-prétibien</i> ).                              |
| g. — Petit psoas ( <i>Prélombo-pubien</i> ).   | x. — Fascia lata ( <i>Iléo-fascien</i> ).  |
| h. — Grand psoas ( <i>Prélombo-trochantinien</i> ).  | z. — Gastrocnémien externe { ( <i>Bi-fémoro-calcanien</i> ).                         |
| i. — Iliaque ( <i>Ilio-trochantinien</i> ).  | z <sup>1</sup> . — — interne {   |
| k. — 1 <sup>er</sup> Pectiné { (portion des <i>Pubo-fémoriens</i> ).   | ε. — Soléaire ( <i>Tibio-calcanien</i> ).  |
| k <sup>1</sup> . — 2 <sup>e</sup> Pectiné {  | γ. — Plantaire grêle ( <i>Fémori-calcanien</i> ).                                    |
| l. — 1 <sup>er</sup> ou Court adducteur ( <i>Sous-pubo-fémorien</i> ).   | δ. — Tibial ou Jambier antérieur ( <i>Tibio-sus-tarsien</i> ).                       |
| l <sup>1</sup> . — 2 <sup>e</sup> ou Moyen adducteur ( <i>Sous-pubi-fémorien</i> ).  | ε. — Long péronier ( <i>Péronéo-sous-tarsien</i> ).                                  |
| l <sup>2</sup> . — 3 <sup>e</sup> ou Long adducteur ( <i>Ischii-fémorien</i> ).  | ε <sup>1</sup> . — Moyen péronier ( <i>Péronéo-sus-métatarsien</i> ).                |
| m. — Vaste externe { (portions du <i>Tri-fémoro-calcanien</i> ).   | ε <sup>2</sup> . — Court péronier ( <i>Péronéi-sus-métatarsien</i> ).                |
| n. — Vaste interne {   | ζ. — Long extenseur commun ( <i>Péronéo-sus-onguien</i> ).                           |
|  | ι. — Long fléchisseur commun ( <i>Tibio-sous-onguien</i> ).                          |
|  | ι <sup>1</sup> . — — du pouce ( <i>Tarso-phalangien</i> ).                           |

AD. FOILLON.

Fig. 1.

Face latérale  
peaucier.



Fig. 2.

Face latérale,  
1<sup>re</sup> couche.










Fig. 1  
Face abdominale  
1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> couche.



Cuvier, del.

Fig. 2.  
Face abdominale  
3<sup>e</sup> couche.



Imp. Auguste Brey à Paris.







# MYOLOGIE DU CABIAI

(HYDROCHERUS CAPIBARA, Cuv., Règ. an., t. I, p. 213).

## INDICATION DES MUSCLES.

### 1<sup>o</sup> Muscles de la peau.

(Pl. 240, fig. 1 et 2; — 242, fig. 2 et 3.)

4. — Thoraco-facien.  
5<sup>e</sup>. — Portion latérale.  
+5<sup>e</sup>. — Peaucier profond.

- 5<sup>d</sup>. — Portion ventrale dont la partie antérieure va envelopper le coude et la partie postérieure va à la cuisse.

### 2<sup>o</sup> Muscles de l'épine.

(Pl. 241, fig. 1, 2, 3.)

- A. — Épineux du dos ou Tendino-épineux.  
B. — Long dorsal.  
C. — Sacro-lombaire.  
D. — Grand transversaire.  
D'. — Transversaire grêle ou Cervical descendant.  
E. — Demi-épineux du cou.  
I. — Splénus de la tête (*Cervico-mastoïdien*).  
I'. — Splénus du cou (*Dorso-trachélien*).

- L. — Grand complexus (*Trachélo-occipiten*).  
L'. — Petit complexus (*Trachélo-mastoïdien*).  
N. — Petit oblique ou Oblique supérieur (*Atloïdo-post-mastoïdien*).  
N'. — Grand oblique ou Oblique inférieur (*Axoïdo-atloïdien*).  
Q. — Ischio-caudien (*Ischio-coccygien externe*).

### 3<sup>o</sup> Muscles du tronc et des côtes.

(Pl. 240, fig. 2; — 241, fig. 2; — 242, fig. 3.)

6. — Scalène, portion extérieure ou inférieure (portion du *Trachélo-costien*).  
10. — Petit dentelé supérieur ou antérieur (*Dorso-costien*).

11. — Petit dentelé inférieur ou postérieur (*Lombocostien*).  
13. — Grand oblique (*Costo-abdominien*).  
15. — Droits du bas-ventre (*Sterno-pubiens*).

### 4<sup>o</sup> Muscles du membre antérieur.

(Pl. 240, fig. 1 et 2; — 241, fig. 1 et 2; — 242, fig. 2 et 3.)

- a<sup>1</sup> et k. — Deltoïdo-trapèze.  
a<sup>1</sup>. — Trapèze ou Cucullaire, portion cervicale } (portion du *Dorso-sus-acromien*).  
a<sup>2</sup>. — *Idem*, portion dorsale }  
b. — Sterno-mastoïdien ou trachélien.  
c. — Rhomboïde de la tête }  
c<sup>1</sup>. — du cou } (*Dorso-trachélien*).  
c<sup>2</sup>. — du dos }  
d. — Omo- ou Acromio-trachélien; il se porte à l'aponévrose du bras.  
g. — Grand dentelé (*Scapulo-costien*).  
h. — Sous-clavier (*Costo-clavien*).  
i. — Grand dorsal.  
j. — Grand pectoral, portion sternale (*Sterno-humérien*). « Peaucier ou Grand pectoral allant à l'aponévrose de l'avant-bras. » (G. Cuvier.)  
j<sup>1</sup>. — *Idem*, portion costale et même ventrale. « Dans la planche 242, fig. 3, on voit en j<sup>1</sup> une portion allant à l'Humérus; à la partie supérieure, au-dessus des lignes ponctuées, sous le Petit pectoral des hippotomistes, est un petit muscle, une 5<sup>e</sup> portion s'insérant par un tendon plat sous la face pro-

- fonde du Petit pectoral. » (Note de G. Cuvier.)  
j<sup>2</sup>. — Grand pectoral, portion profonde, dite Moyen ou Petit pectoral.  
k. — Deltoïde (*Sous-acromio-humérien*), portion claviculaire.  
k<sup>1</sup>. — *Idem*, portion scapulaire.  
l. — Sur-épineux (*Sus-scapulo-trochitérien*).  
n. — Sous-scapulaire (*Scapulo-trochinien*).  
o. — Grand rond (*Scapulo-humérien*).  
r. — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras (*Scapulo-radial*), portion coracoïdienne.  
r<sup>1</sup>. — *Idem*, portion bicipitale.  
s. — Brachial interne ou Court fléchisseur (*Huméro-cubiten*).  
t. — Triceps (*Scapulo-olécranien*), portion scapulaire.  
t<sup>1</sup>. — *Idem*, portion humérale externe.  
t<sup>2</sup>. — *Idem*, portion humérale interne.  
t<sup>3</sup>. — *Idem*, portion allant au tendon du Grand dorsal, dite 4<sup>e</sup> Extenseur.  
α. — Palmaire grêle (*Épitrochlo-palmaire*).  
ε. — Cubital interne (*Épitrochlo-carpien*).  
ε<sup>1</sup>. — — — externe (*Cubito-sus-métacarpien*).

## MYOLOGIE DU CABIAL.

- |  |  |
|--|--|
| <p>γ. — Radial interne (<i>Épitrochlo-métacarpien</i>).</p> <p>δ. — 1<sup>er</sup> Radial externe (<i>Huméro-sus-métacarpien</i>).</p> <p>ε. — Extenseur commun (<i>Épicondylo-sus-phalangien</i>).</p> <p>ε<sup>1</sup>. — — propre du petit doigt (<i>Id. du petit doigt</i>).</p> <p>ζ. — Court extenseur du pouce (<i>Cubito-sus-phalangien</i>).</p> <p>ι. — Long abducteur du pouce (<i>Cubito-sus-métacarpien</i>).</p> | <p>κ. — Fléchisseur sublime (<i>Épitrochlo-phalangien</i>).</p> <p>π. — Opposant (<i>Carpo-métacarpien</i>).</p> <p>ρ. — Adducteur du pouce (<i>Métacarpo-phalangien</i>).</p> <p>σ. — Court fléchisseur du petit doigt (<i>Carpo-métacarpien</i>).</p> <p>τ. — Lombricaux (<i>Palmo-phalangiens</i>).</p> |
|--|--|

### 5<sup>o</sup> Muscles du membre postérieur.

(Pl. 240, fig. 2; — 241, fig. 1 et 2; — 242, fig. 1 et 3.)

- |  |  |
|--|--|
| <p>a. — Grand fessier (<i>Sacro-fémorien</i>).</p> <p>a<sup>1</sup>. — Moyen fessier (<i>Ilio-trochantérien</i>).</p> <p>+a<sup>1</sup>. — Ligne ponctuée indiquant l'attache du Moyen fessier.</p> <p>a<sup>2</sup>. — Petit fessier (<i>Ilii-trochantérien</i>).</p> <p>b. — Carré de la cuisse (<i>Ischio-trochantérien</i>).</p> <p>c. — Jumeau supérieur } (<i>Ischii-trochantériens</i>).</p> <p>c<sup>1</sup>. — — inférieur }</p> <p>f. — Pyramidal (<i>Sacro-trochantérien</i>). Pyriforme de Cuvier. En + on voit un muscle placé sous le Pyriforme et allant s'insérer par son bord à la face inférieure du Moyen fessier. (G. Cuvier.)</p> <p>g. — Petit psoas (<i>Prélombo-pubien</i>).</p> <p>h. — Grand psoas (<i>Prélombo-trochantinien</i>).</p> <p>i. — Iliaque (<i>Ilio-trochantinien</i>).</p> <p>k. — 1<sup>er</sup> Pectiné } (portion des <i>Pubo-fémoriens</i>).</p> <p>k<sup>1</sup>. — 2<sup>e</sup> Pectiné }</p> <p>l. — 1<sup>er</sup> ou Court adducteur (<i>Sous-pubo-fémorien</i>).</p> <p>l<sup>1</sup>. — 2<sup>e</sup> ou Moyen adducteur (<i>Sous-pubi-fémorien</i>).</p> <p>l<sup>2</sup>. — 3<sup>e</sup> ou Long adducteur (<i>Ischii-fémorien</i>).</p> <p>m. — Vaste externe } (portion du <i>Tri-fémoro-rotulien</i>).</p> <p>n. — Vaste interne }</p> | <p>p. — Grêle ou Droit antérieur, ou 4<sup>e</sup> Extenseur (<i>Iléo-rotulien</i>).</p> <p>q. — Biceps (<i>Ischio-péronien</i>).</p> <p>q<sup>1</sup>. — Sa portion fémorale.</p> <p>r. — Demi-nerveux ou tendineux (<i>Ischio-prétibien</i>).</p> <p>s. — Demi-membraneux (<i>Ischio-sous-tibien</i>).</p> <p>t. — Couturier (<i>Iléo-prétibien</i>).</p> <p>u. — 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> Grêle ou Droit interne (<i>Pubio-prétibien</i>).</p> <p>v. — Poplité (<i>Poplito-tibien</i>).</p> <p>α. — Gastrocnémien externe (portion du <i>Bi-fémoro-calcanien</i>).</p> <p>ε. — Soléaire (<i>Tibio-calcanien</i>).</p> <p>γ. — Plantaire grêle (<i>Fémori-calcanien</i>).</p> <p>δ. — Tibial ou Jambier antérieur (<i>Tibio-sus-tarsien</i>).</p> <p>ε. — Long péronier (<i>Péronéo-sous-tarsien</i>).</p> <p>ε<sup>1</sup>. — Moyen péronier (<i>Péronéo-sus-métatarsien</i>).</p> <p>ε<sup>2</sup>. — Court péronier (<i>Péronéi-sus-métatarsien</i>).</p> <p>ζ. — Long extenseur commun (<i>Péronéo-sus-onguien</i>).</p> <p>ι. — Long fléchisseur commun (<i>Tibio-sous-onguien</i>).</p> <p>π. — Lombricaux (<i>Plantis-sous-phalangiens</i>).</p> |
|--|--|

AD. FOCHLON.

Fig. 1.  
Muscle peaucier




Fig. 2.  
Face latérale  
2<sup>e</sup> couche












Fig. 1.

Membre postérieur gauche  
face interne




Fig. 2.

Membre antérieur gauche  
face interne





Fig. 3.

Face ventrale  
1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> couche.





# MYOLOGIE DE L'AGOUTI

(*CAVIA ACUTI*, Lin., Cuv., *Règ. an.*, t. 1, p. 214.)

## INDICATION DES MUSCLES.

### 1<sup>o</sup> Muscles peauciers.

(Pl. 243 — 244.)

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 2. — Facien.                         | 5 <sup>a</sup> . — Portion scapulaire. |
| 3. — Cervico-facien.                 | 5 <sup>b</sup> . — dorsale.            |
| 3 <sup>a</sup> . — Dorso-occipitien. | 5 <sup>c</sup> . — latérale.           |
| 4. — Thoraco-facien.                 | 5 <sup>d</sup> . — ventrale.           |

### 2<sup>o</sup> Muscles de la face et de l'os hyoïde.

(Pl. 243 — 245 — 248, fig. 1.)

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| b. — Temporal ou Crotaphyte.                    | q. — Digastrique.                     |
| g. — Élévateur propre de la lèvre supérieure.   | r. — Mylo-hyoïdien.                   |
| j. — Masseter.                                  | x. — Sterno-hyoïdien.                 |
| j <sup>1</sup> . — Seconde portion du Masseter. | x <sup>1</sup> . — Sterno-thyroïdien. |

### 3<sup>o</sup> Muscles de l'épine.

(Pl. 243 — 247 — 248, fig. 1 et 2.)

- |   |  |
|---|--|
| A. — Épineux du dos ou Tendino-épineux.                   | I <sup>1</sup> . — Splénus du cou ( <i>Dorso-trachélien</i> ).     |
| B. — Long dorsal.   | L. — Grand complexus ( <i>Trachélo-occipitien</i> ).               |
| C. — Sacro-lombaire.                                      | L <sup>1</sup> . — Petit complexus ( <i>Trachélo-mastoïdien</i> ). |
| D. — Grand transversaire.                                 | M. — Grand droit antérieur ( <i>Trachélo-sous-occipitien</i> ).    |
| H. — Épineux transversaires ou <i>Multifidus spignæ</i> . | P. — Carré des lombes.   |

### 4<sup>o</sup> Muscles du tronc et des côtes.

(Pl. 243 — 245 — 248, fig. 1 et 2.)

- |  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| 6. — Scalène, portion extérieure ou inférieure                       | } ( <i>Trachélo-costien</i> ). | 11. — <i>Idem</i> inférieur ou postérieur ( <i>Lombo-costien</i> ). |
| 6 <sup>a</sup> . — <i>Idem</i> , portion moyenne                     |                                | 13. — Grand oblique ( <i>Costo-abdominien</i> ).                    |
| 6 <sup>b</sup> . — <i>Idem</i> , port. extérieure ou supérieure      |                                | 14. — Petit oblique ou Oblique interne ( <i>Iléo-abdominien</i> ).  |
| 10. — Petit dentelé supérieur ou antérieur ( <i>Dorso-costien</i> ). |                                | 15. — Droits du bas-ventre ( <i>Sterno-pubiens</i> ).               |
|  |                                | 17. — Transverse du bas-ventre ( <i>Lombo-abdominien</i> ).         |

### 5<sup>o</sup> Muscles du membre antérieur.

(Pl. 243 — 245 — 246, fig. 1, 2, 3; — 248, fig. 1.)

- |   |  |   |
|---|--|---|
| a. — Trapèze ou Cucullaire, portion occipitale  | } ( <i>Dorso-sus-acromien</i> ).         | j <sup>2</sup> +h. — Sous-clavier ( <i>Costo-clavier</i> ).   |
| a <sup>1</sup> . — <i>Idem</i> , portion cervicale                                    |  | k. — Deltoïde ( <i>Sous-acromio-humérien</i> ), portion claviculaire.                                     |
| a <sup>2</sup> . — <i>Idem</i> , portion dorsale                                      |  | k <sup>1</sup> . — <i>Idem</i> , portion scapulaire.  |
| b. — Sterno-mastoïdien ou trachélien.   |  | l. — Sur-épineux ( <i>Sus-scapulo-trochitérien</i> ).   |
| b <sup>1</sup> . — Cléido-mastoïdien ou trachélien.                                   |  | m. — Sous-épineux ( <i>Sous-scapulo-trochitérien</i> ).   |
| c. — Rhomboïde de la tête   | } (portion du <i>Dorso-trachélien</i> ). | n. — Sous-scapulaire ( <i>Scapulo-trochinien</i> ).   |
| c <sup>1</sup> . — — du cou   |  | o. — Grand rond ( <i>Scapulo-humérien</i> ).  |
| d <sup>1</sup> . — Releveur ou angulaire de l'omoplate ( <i>Trachélo-scapulien</i> ). |  | r. — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras ( <i>Scapulo-radialien</i> ), portion coracoïdienne.      |
| d <sup>1</sup> +a. — Scapulo-trachélien-trapèze.                                      |  | s. — Brachial interne ou Court fléchisseur ( <i>Huméro-cubitien</i> ).                                    |
| g. — Grand dentelé ( <i>Scapulo-costien</i> ).  |  | t. — Triceps ( <i>Scapulo-olécranien</i> ), portion scapulaire.   |
| i. — Grand dorsal.  |  | t <sup>1</sup> . — <i>Idem</i> , portion humérale externe.  |
| j. — Grand pectoral, portion sternale ( <i>Sterno-humérien</i> ).                     |  | t <sup>2</sup> . — <i>Idem</i> , portion humérale interne.  |
| j <sup>1</sup> . — — — — — portion costale ou même ventrale.                          |  | t <sup>3</sup> . — <i>Idem</i> , portion allant au tendon du Grand dorsal, dite 4 <sup>e</sup> Extenseur. |
| j <sup>2</sup> . — — — — — portion profonde, dite Moyen ou Petit pectoral.            |  |   |

## MYOLOGIE DE L'AGOUTI.


- |   |  |
|---|--|
| <p>x. — Rond pronateur (<i>Épitrochlo-radien</i>).<br/>         z. — Palmaire grêle (<i>Épitrochlo-palmaire</i>).<br/>         ε. — Cubital interne (<i>Épitrochlo-carpien</i>).<br/>         ε<sup>1</sup>. — — externe (<i>Cubito-sus-métacarpien</i>).<br/>         δ. — 1<sup>er</sup> Radial externe (<i>Huméro-sus-métacarpien</i>).<br/>         ε. — Extenseur commun (<i>Épicondylo-sus-phalangien</i>).<br/>         ε<sup>1</sup>. — <i>Idem</i> propre du petit doigt (<i>Idem du petit doigt</i>).</p> | <p>ι. — Long abducteur du pouce (<i>Cubito-sus-métacarpien</i>).<br/>         μ. — Fléchiss. profond, portion radiale } (<i>Cubito-sus-onguien</i>).<br/>         μ<sup>1</sup>. — — — — — portion humérale }<br/>         μ<sup>2</sup>. — — — — — portion cubitale }<br/>         ν. — Adducteur du petit doigt (<i>Carmo-phalangien</i>).<br/>         ζ. — Inter-osseux supérieurs ou externes (<i>Métacarpus-phalangiens externes</i>).</p> |
|---|--|

### 6° Muscles du membre postérieur.

(Pl. 245 — 247, fig. 1 et 2; — 248, fig. 2.)

- |   |  |
|---|--|
| <p>a. — Grand fessier (<i>Sacro-fémorien</i>).<br/>         a<sup>1</sup>. — Moyen fessier (<i>Ilio-trochantérien</i>).<br/>         g. — Petit Psoas (<i>Prélombo-pubien</i>).<br/>         h. — Grand psoas (<i>Prélombo-trochantinien</i>).<br/>         i. — Iliaque (<i>Ilio-trochantinien</i>).<br/>         l. — 1<sup>er</sup> ou Court adducteur (<i>Sous-pubo-fémorien</i>).<br/>         l<sup>2</sup>. — 3<sup>e</sup> ou Long adducteur (<i>Ischi-fémorien</i>).<br/>         m. — Vaste externe (portion du <i>Tri-fémoro-rotulien</i>).<br/>         q. — Biceps (<i>Ischio-péronien</i>).<br/>         r. — Demi-nerveux ou tendineux (<i>Ischio-prétibien</i>).<br/>         s. — Demi-membraneux (<i>Ischio-sous-tibien</i>).<br/>         t. — Couturier (<i>Ileo-prétibien</i>).<br/>         u. — Grêle ou Droit interne (<i>Pubio-prétibien</i>).</p> | <p>x. — Fascia lata (<i>Ileo-fascien</i>).<br/>         z. — Gastrocnémien externe } (<i>Bi-fémoro-calcanien</i>).<br/>         z<sup>1</sup>. — — — — — interne }<br/>         ε. — Soléaire (<i>Tibio-calcanien</i>).<br/>         γ. — Plantaire grêle (<i>Fémoro-calcanien</i>).<br/>         δ. — Tibial ou Jambier antérieur (<i>Tibio-sus-tarsien</i>).<br/>         ε. — Long péronier (<i>Péronéo-sus-tarsien</i>).<br/>         ε<sup>2</sup>. — Court péronier (<i>Péronéo-sus-métatarsien</i>).<br/>         ζ. — Long extenseur commun (<i>Péronéo-sus-onguien</i>).<br/>         ι. — Long fléchisseur commun (<i>Tibio-sous-onguien</i>).<br/>         ι<sup>1</sup>. — — — — — du pouce (<i>Tarso-phalangien</i>).<br/>         ρ. — Inter-osseux (<i>Métatarso-phalangiens latéraux</i>).</p> |
|---|--|

AD. FOCHLON.



Face ventrale  
Peaucier et 1<sup>re</sup> couche  
du cou

15

15

5<sup>d</sup>

15 - 15














Fig. 2.  
Membre antérieur gauche  
face interne  
1<sup>re</sup> couche.




Fig. 3.  
Membre antérieur gauche  
face interne.  
2<sup>me</sup> couche




Fig. 1  
Muscles du cou  
et de l'épaule  
2<sup>e</sup> couche.






Fig. 2.

Membre postérieur gauche,  
face interne.



Fig. 1.

Membre postérieur gauche,  
face externe.








Fig. 1.

Muscles de l'épine  
et du tronc  
1<sup>re</sup> couche.




Fig. 2.

Muscles de l'épine  
2<sup>e</sup> couche





# MYOLOGIE DU PACA

(CAVIA PACA, Lin., Cav., *Règ. an.*, t. 1, p. 221).

## INDICATION DES MUSCLES.

### 1<sup>o</sup> Muscles peauciers.

(Pl. 249, fig. 1 et 2; — 251, fig. 1 et 2.)

- |  |  |
|--|--|
| 3. — Cervico-facien.   | 5 <sup>d</sup> . — Portion ventrale.                                   |
| 4. — Thoraco-facien. Peaucier superficiel du cou et Peaucier sternal. (G. Cuvier.) | +++ — « Ici l'aponévrose du Peaucier devient adhérente. » (G. Cuvier.) |
| 5 <sup>c</sup> . — Portion latérale. Peaucier profond. (G. Cuvier.)                |  |

### 2<sup>o</sup> Muscles de la face et de l'os hyoïde.

(Pl. 249, fig. 2; — 250, fig. 1; — 251, fig. 1.)

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| b. — Temporal ou Crotaphyte.                              | q. — Digastrique.                     |
| j. — Masseter.  | x. — Sterno-hyoïdien.                 |
| n. — Carré du menton ou Abaisseur de la lèvre inférieure. | x <sup>1</sup> . — Sterno-thyroïdien. |
|   | y. — Thyro-hyoïdien.                  |

### 3<sup>o</sup> Muscles de l'épine.

(Pl. 250, fig. 1, 2 et 3.)

- |  |  |
|--|--|
| A. — Épineux du dos ou Tendino-épineux.                        | L <sup>1</sup> . — Petit complexe ( <i>Trachélo-mastoïdien</i> ).                  |
| B. — Long dorsal.  | M <sup>2</sup> . — Grand droit postérieur ( <i>Axoïdo-occipitien</i> ).            |
| C. — Sacro-lombaire.   | N. — Petit oblique ou Oblique supérieur ( <i>Atloïdo-post-mastoïdien</i> ).        |
| D. — Grand transversaire.                                      | N <sup>1</sup> . — Grand oblique ou Oblique inférieur ( <i>Axoïdo-atloïdien</i> ). |
| H. — Épineux transversaire ou <i>Multifidus spinae</i> .       | Q. — Ischio-caudien ( <i>Ischio-coccygien externe</i> ).                           |
| I. — Splénus de la tête ( <i>Cervico-mastoïdien</i> ).         |  |
| I <sup>1</sup> . — Splénus du cou ( <i>Dorso-trachélien</i> ). |  |
| L. — Grand complexe ( <i>Trachélo-occipitien</i> ).            |  |

### 4<sup>o</sup> Muscles du tronc et des côtes.

(Pl. 249, fig. 2; — 250, fig. 1; — 251, fig. 1.)

- |  |  |
|--|--|
| 6 <sup>a</sup> . — Scalène, portion moyenne (portion du <i>Trachélo-costien</i> ). | 13. — Grand oblique ( <i>Costo-abdominien</i> ).   |
| 10. — Petit dentelé supérieur ou antérieur ( <i>Dorso-costien</i> ).               | 14. — Petit oblique ou Oblique interne ( <i>Iléo-abdominien</i> ). Oblique ascendant. (G. Cuvier.) |
| 11. — <i>Idem</i> inférieur ou postérieur ( <i>Lombo-costien</i> ).                | 15. — Droits du bas-ventre ( <i>Sterno-pubiens</i> ).  |

### 5<sup>o</sup> Muscles du membre antérieur.

(Pl. 249, fig. 1 et 2; — 250, fig. 1; — 251, fig. 1, 2 et 3.)

- |  |   |
|--|---|
| a. — Trapèze ou Cucullaire, portion occipitale (portion du <i>Dorso-sus-acromien</i> ).                          | quelques fibres du Grand pectoral et va, comme à l'ordinaire, par-dessous la clavicule, former le Petit pectoral des hippotomistes. » (G. Cuvier.)                        |
| b. — Sterno-mastoïdien ou trachélien.  | i. — Grand dorsal.  |
| b <sup>1</sup> . — Cléïdo-mastoïdien ou trachélien.  | j. — Grand pectoral, portion sternale ( <i>Sterno-humérien</i> ).   |
| +b <sup>1</sup> . — Cléïdo-basilaire.  | j <sup>1</sup> . — <i>Idem</i> , portion costale et même ventrale. « Cette 2 <sup>o</sup> portion du Grand pectoral insère quelques fibres à la clavicule. » (G. Cuvier.) |
| c. — Rhomboïde de la tête  | j <sup>2</sup> . — <i>Idem</i> , portion profonde dite Moyen ou Petit pectoral.   |
| c <sup>1</sup> . — du cou  | k. — Deltoïde ( <i>Sous-acromio-humérien</i> ).   |
| c <sup>2</sup> . — du dos  | k <sup>1</sup> . — <i>Idem</i> , portion scapulaire.  |
| +c. — Portion trachélienne du Rhomboïde ou languette externe du Grand dentelé. (G. Cuvier.)                      | l. — Sur-épineux ( <i>Sus-scapulo-trochitérien</i> ).   |
| d. — Analogue de l'Omo-trachélien. « La portion antérieure du Trapèze donne une lame à ce muscle. » (G. Cuvier.) | m. — Sous-épineux ( <i>Sous-scapulo-trochitérien</i> ).   |
| g. — Grand dentelé ( <i>Scapulo-costien</i> ).   |   |
| h. — Sous-clavier ( <i>Costo-clavien</i> ). « Ce muscle reçoit   |   |

## MYOLOGIE DU PACA.

- |   |  |
|---|--|
| <p>n. — Sous-scapulaire (<i>Scapulo-trochinien</i>).</p> <p>o. — Grand rond (<i>Scapulo-humérien</i>).</p> <p>r<sup>1</sup>. — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras (<i>Scapulo-radial</i>), portion bicapitale.</p> <p>s. — Brachial interne ou Court fléchisseur (<i>Huméro-cubitien</i>).</p> <p>t. — Triceps (<i>Scapulo-olécranien</i>), portion scapulaire.</p> <p>t<sup>1</sup>. — <i>Idem</i>, portion humérale externe.</p> <p>t<sup>2</sup>. — <i>Idem</i>, portion humérale interne.</p> <p>t<sup>3</sup>. — <i>Idem</i>, portion allant au tendon du Grand dorsal, dite 4<sup>e</sup> Extenseur.</p> <p>v. — Long supinateur (<i>Huméro-sus-radial</i>).</p> <p>x. — Rond pronateur (<i>Épitrochlo-radial</i>).</p> <p>h, j. — Dans la planche 251, fig. 3, on voit en h et j « le Sous-clavier et la 3<sup>e</sup> portion du Grand pectoral allant former ensemble le Petit pectoral des hippotomistes. » (Note de G. Cuvier.)</p> <p>†+. — Dans la planche 251, fig. 2, on voit en + « les attaches du Trapèze à l'Omo-trachélien ou plutôt Brachio-basilaire, et en † l'insertion du Brachio-basilaire. » (Note de G. Cuvier.)</p> <p>α. — Palmar grêle (<i>Épitrochlo-palmar</i>).</p> | <p>ε. — Cubital interne (<i>Épitrochlo-carpien</i>).</p> <p>ε<sup>1</sup>. — — — externe (<i>Cubito-sus-métacarpien</i>).</p> <p>γ. — Radial interne (<i>Épitrochlo-métacarpien</i>).</p> <p>δ. — 1<sup>er</sup> Radial externe (<i>Huméro-sus-métacarpien</i>).</p> <p>δ<sup>1</sup>. — 2<sup>e</sup> Radial externe (<i>Épicondylo-sus-métacarpien</i>).</p> <p>ε. — Extenseur commun (<i>Épicondylo-sus-phalangien</i>).</p> <p>ε<sup>1</sup>. — <i>Idem</i> propre du petit doigt (<i>Id. du petit doigt</i>).</p> <p>ε<sup>2</sup>. — <i>Idem</i> propre de l'index (<i>Cubito-sus-phalangien de l'index</i>).</p> <p>ζ. — Long extenseur du pouce (<i>Id. du pouce</i>).</p> <p>ι. — Long abducteur du pouce (<i>Cubito-sus-métacarpien</i>).</p> <p>κ. — Fléchisseur sublime (<i>Épitrochlo-phalangien</i>).</p> <p>μ. — Fléchisseur profond, portion radiale</p> <p>μ<sup>1</sup>. — <i>Idem</i>, portion humérale</p> <p>μ<sup>2</sup>. — <i>Idem</i>, portion cubitale</p> <p>π. — Opposant du pouce (<i>Carpo-métacarpien</i>).</p> <p>σ. — Court fléchisseur du petit doigt (<i>Carpo-métacarpien</i>).</p> <p>τ. — Opposant du petit doigt.</p> |
|---|--|

### 6<sup>e</sup> Muscles du membre postérieur.

(Pl. 249, fig. 2; — 250, fig. 1 et 2; — 251, fig. 1 et 4.)

- |  |  |
|--|--|
| <p>a. — Grand fessier (<i>Sacro-fémorien</i>).</p> <p>a<sup>1</sup>. — Moyen fessier (<i>Ilio-trochantérien</i>).</p> <p>a<sup>2</sup>. — Petit fessier (<i>Ilii-trochantérien</i>).</p> <p>+a. — « Muscle qui s'unit à la face profonde du Moyen fessier. » (Note de G. Cuvier.)</p> <p>b. — Carré de la cuisse (<i>Ischio-trochantérien</i>).</p> <p>d. — Obturateur externe (<i>Sous-pubio-trochantérien externe</i>).</p> <p>e. — Jumeau supérieur</p> <p>e<sup>1</sup>. — Jumeau inférieur</p> <p>f. — Pyramidal (<i>Sacro-trochantérien</i>). Pyriforme. (G. Cuvier.)</p> <p>i. — Iliaque (<i>Ilio-trochantinien</i>).</p> <p>l. — 1<sup>er</sup> ou Court adducteur (<i>Sous-pubo-fémorien</i>).</p> <p>l<sup>2</sup>. — 3<sup>e</sup> ou Long adducteur (<i>Ischii-fémorien</i>).</p> <p>m. — Vaste externe</p> <p>n. — Vaste interne</p> <p>o. — Crural</p> <p>p. — Grêle ou Droit antérieur, ou 4<sup>e</sup> Extenseur (<i>Ilio-rotulien</i>).</p> <p>q. — Biceps (<i>Ischio-péronien</i>).</p> <p>r. — Demi-nerveux ou tendineux (<i>Ischio-prétibien</i>).</p> <p>s. — Demi-membraneux (<i>Ischio-sous-tibien</i>).</p> | <p>t. — Conturier (<i>Ileo-prétibien</i>).</p> <p>u. — Grêle ou Droit interne (<i>Pubio-prétibien</i>).</p> <p>v. — Poplité (<i>Poplito-tibien</i>).</p> <p>x. — Fascia lata (<i>Ileo-fascien</i>).</p> <p>α. — Gastrocnémien externe</p> <p>α<sup>1</sup>. — — — interne</p> <p>ε. — Soléaire (<i>Tibio-calcanien</i>).</p> <p>γ. — Plantaire grêle (<i>Fémoro-calcanien</i>).</p> <p>δ. — Tibial ou Jambier antérieur (<i>Tibio-sus-tarsien</i>).</p> <p>δ<sup>1</sup>. — — — postérieur (<i>Tibio-sous-tarsien</i>).</p> <p>ε. — 1<sup>er</sup> ou Long péronier (<i>Péronéo-sous-tarsien</i>).</p> <p>ε<sup>1</sup>. — 2<sup>e</sup> ou Moyen péronier (<i>Péronéo-sus-métatarsien</i>).</p> <p>ε<sup>2</sup>. — 3<sup>e</sup> ou Court péronier (<i>Péronéi-sus-métatarsien</i>).</p> <p>ε<sup>3</sup>. — 4<sup>e</sup> péronier. (G. Cuvier.)</p> <p>ζ. — Long extenseur commun (<i>Péronéo-sus-onguien</i>).</p> <p>ζ<sup>2</sup>. — — — du 1<sup>er</sup> doigt ou de l'index.</p> <p>ζ. — Court extenseur commun ou Pédieux (<i>Calcanéo-sus-onguien</i>).</p> <p>ι. — Long fléchisseur commun (<i>Tibio-sous-onguien</i>).</p> <p>ι<sup>1</sup>. — — — du pouce (<i>Tarso-phalangien</i>).</p> <p>μ. — Court abducteur du pouce.</p> <p>ο. — Chair carrée ou Accessoire du Fléchisseur commun.</p> |
|--|--|

### 7<sup>e</sup> Diverses autres parties.

(Pl. 250, fig. 1 et 2; — 251, fig. 1.)

- |   |   |
|---|---|
| <p>π. — Pénis.</p> <p>π. — Testicules.</p> <p>σ. — Muscle ischio-caverneux.</p> <p>ζ. — Sphincter de l'anus. « Le Sphincter de l'anus</p> | <p>adhère au Demi-membraneux. » (Note de G. Cuvier.)</p> <p>††. — « Bride du Pénis formée de fibres attachées sur le Peaucier. » (Note de G. Cuvier.)</p> |
|---|---|

Fig. 1.  
Muscle peaucier




Fig. 2  
Face latérale,  
1<sup>ère</sup> couche.






Fig. 1

Face latérale  
2<sup>e</sup> couche.




Fig. 2.

Face latérale  
3<sup>e</sup> couche.




Fig. 3.

Muscles de l'épine  
couche profonde.









Fig. 1.  
Face ventrale du corps  
muscle peaucier et  
1<sup>re</sup> couche



Cuvier del

Fig. 2.

Membre antérieur gauche  
Face externe




Fig. 3.

Membre antérieur gauche  
Face interne




Fig. 4.

Membre postérieur  
jambe et pied  
Face postérieure



Imp. Auguste Rey Paris



# MYOLOGIE

## DU PARESSEUX TRIDACTYLE

(BRADYPUS TRIDACTYLUS, Lin., Cuv., *Rég. an.*, t. 1<sup>er</sup>, p. 217).

### INDICATION DES MUSCLES.

#### 1<sup>o</sup> Muscles peauciers.

(Pl. 252, fig. 1 et 2; — 253.)

5<sup>o</sup>. — Portion latérale.

#### 2<sup>o</sup> Muscles de la face et de l'os hyoïde.

(Pl. 252, fig. 1; — 253.)

b. — Temporal ou Crotaphyte.

j. — Masseter.

q. — Digastrique.

r. — Mylo-hyoïdien.

s. — Stylo-hyoïdien.

x. — Sterno-hyoïdien.

x<sup>1</sup>. — Sterno-thyroïdien.

#### 3<sup>o</sup> Muscles de l'épine.

(Pl. 252, fig. 1 et 2; — 253.)

B. — Long dorsal.

C. — Sacro-lombaire.

E<sup>1</sup>. — Demi-épineux du dos.

I. — Splénus de la tête (*Cervico-mastoïdien*).

P. — Splénus du cou (*Dorso-trachélien*). « Il passe en partie sous le Rhomboïde. » (Note de G. Cuvier.)

L. — Grand complexe (*Trachélo-occipitien*).

M<sup>2</sup>. — Grand droit postérieur (*Axoïdo-occipitien*).

N. — Petit oblique ou Oblique supérieur (*Atloïdo-post-mastoïdien*).

N<sup>1</sup>. — Grand oblique ou Oblique inférieur (*Axoïdo-atloïdien*).

O. — Long antérieur du cou (*Prédorso-atloïdien*).

X. — Pubo-sous-caudien (*Pubo-coccygien*).

Y. — Ischio-caudien (*Ischio-coccygien externe*).

#### 4<sup>o</sup> Muscles du tronc et des côtes.

(Pl. 252, fig. 1 et 2; — 253.)

6. — Scalène, portion exté-  
rieure ou inférieure } (portion du *Trachélo-cos-*  
tieu).

6<sup>a</sup>. — *Idem*, portion moyenne

13. — Grand oblique (*Costo-abdominien*).

14. — Petit oblique ou Oblique interne (*Iléo-abdomi-*  
nien).

15. — Droits du bas-ventre (*Sterno-pubiens*).

#### 5<sup>o</sup> Muscles du membre antérieur.

(Pl. 252 et 253.)

a<sup>1</sup>. — Trapèze ou Cucullaire, } (portion du *Dorso-sus-*  
portion cervicale } *acromien*).

a<sup>2</sup>. — *Idem*, portion dorsale }  
« Le Rhomboïde est en points sous le Trapèze. »  
(Note de G. Cuvier.)

b. — Sterno-mastoïdien ou trachélien.

c<sup>2</sup>. — Rhomboïde du dos (portion du *Dorso-trachélien*).

d. — Omo- ou Acromio-trachélien.

f. — Dentelé antérieur ou Petit Pectoral (*Costo-cora-*  
coïdien).

g. — Grand dentelé (*Scapulo-costien*).

i. — Grand dorsal.

j. — Grand pectoral, portion sternale (*Sterno-humé-*  
rien).

j<sup>1</sup>. — *Idem*, portion costale et même ventrale.

j<sup>2</sup>. — *Idem*, portion profonde dite Moyen ou Petit pec-  
toral.

k. — Deltoïde (*Sous-acromio-humérien*), portion clavi-  
culaire.

k<sup>1</sup>. — *Idem*, portion scapulaire.

+k. — Muscle allant de la clavicule à l'avant-bras (Ac-  
cessoir du Deltoïde).

m. — Sous-épineux (*Sous-scapulo-trochitérien*).

o. — Grand rond (*Scapulo-humérien*).

q. — Coraco-brachial (*Coraco-humérien*).

r. — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras (*Sca-*  
pulo-radial), portion coracoïdienne.

s. — Brachial interne ou Court fléchisseur (*Huméro-*  
cubitien).

t. — Triceps (*Scapulo-olécranien*), portion scapulaire.

t<sup>1</sup>. — portion humérale externe.

t<sup>2</sup>. — portion humérale interne.

t<sup>3</sup>. — portion allant au tendon du Grand dorsal,  
dite 4<sup>e</sup> Extenseur.

# MYOLOGIE DU PARESSEUX TRIDACTYLE.

- u. — Anconé (*Épicondylo-cubiten*) externe.
- v. — Long supinateur (*Huméro-sus-radien*).
- x. — Rond pronateur (*Épitrochlo-radien*).
- x, v. — (Pl. 253.) Tendon commun du Long supinateur et du Rond pronateur. (Note de G. Cuvier.)
- ε. — Cubital interne (*Épitrochlo-carpien*).
- ε<sup>1</sup>. — — externe (*Cubito-sus-métacarpien*).
- γ. — Radial interne (*Épitrochlo-métacarpien*).
- δ. — 1<sup>er</sup> Radial externe (*Huméro-sus-métacarpien*).
- ε. — Extenseur commun (*Épicondylo-sus-phalangetien*).
- ε<sup>1</sup>. — *Idem* propre du petit doigt (*Épicondylo-sus-phalangetien du petit doigt*).
- ε<sup>2</sup>. — *Idem* propre de l'index (*Cubito-sus-phalangetien de l'index*).

- ι. — Long abducteur du pouce (*Cubito-sus-métacarpien*).
- λ. — Long fléchisseur du pouce (*Radio-sous-onguien*). « Il n'y a pas de Fléchisseur sublime. » (Note de G. Cuvier).
- μ. — Fléchisseur profond, portion radiale } (*Cubito-sous-onguien*).
- μ<sup>1</sup>. — *Idem*, portion humérale }
- μ<sup>2</sup>. — *Idem*, portion cubitale }
- ν<sup>1</sup>. — 1<sup>er</sup> Inter-osseux externe.
- ν<sup>2</sup>. — Court abducteur du pouce.
- ζ. — Inter-osseux supérieurs ou externes (*Métacarpo-sus-phalangiens*). « Les doigts sont maintenus fléchis par la position des tendons, et non par les ligaments. » (Note de G. Cuvier).

## 6<sup>e</sup> Muscles du membre postérieur.


(Pl. 252 — 253.)

- a. — Grand fessier (*Sacro-fémorien*).
- +a. — Accessoire du Grand fessier. (G. Cuvier).
- a<sup>1</sup>. — Moyen fessier (*Ilio-trochantérien*).
- a<sup>2</sup>. — Petit fessier (*Ilii-trochantérien*).
- b. — Carré de la cuisse (*Ischio-trochantérien*).
- d. — Obturateur externe (*Sous-pubio-trochantérien externe*).
- f. — Pyramidal (*Sacro-trochantérien*).
- i. — Iliaque (*Ilio-trochantinien*).
- k. — 1<sup>er</sup> Pectiné } (portions des *Pubo-fémoriens*).
- k<sup>1</sup>. — 2<sup>e</sup> Pectiné }
- l. — 1<sup>er</sup> ou Court adducteur (*Sous-pubo-fémorien*).
- l<sup>2</sup>. — 3<sup>e</sup> ou Long adducteur (*Ischii-fémorien*).
- m. — Vaste externe } (portion du *Tri-fémoro-calcanien*).
- n. — Vaste interne }
- p. — Grêle ou Droit antérieur, ou 4<sup>e</sup> Extenseur (*Iléo-rotulien*).
- q. — Biceps (*Ischio-péronien*).
- q et q<sup>1</sup>. — Accessoire fémorien du Biceps. (G. Cuvier).
- r. — Demi-nerveux ou tendineux (*Ischio-prétibien*).
- s. — Demi-membraneux (*Ischio-sous-tibien*).
- t. — Couturier (*Iléo-prétibien*).
- u. — Grêle ou Droit interne (*Pubio-prétibien*).

- + . — (Pl. 253.) Releveur du clitoris.
- α<sup>1</sup>. — Gastrocnémien interne (portion du *Bi-fémoro-calcanien*).
- ε. — Soléaire (*Tibio-calcanien*).
- γ. — Plantaire grêle (*Fémoro-calcanien*).
- δ. — Tibial ou Jambier antérieur (*Tibio-sus-tarsien*).
- δ<sup>1</sup>. — — postérieur (*Tibio-sous-tarsien*).
- ε. — Long péronier (*Péronéo-sous-tarsien*).
- ε<sup>1</sup>. — Moyen péronier (*Péronéo-sus-métatarsien*).
- ε<sup>2</sup>. — Court péronier (*Péronéo-sus-métatarsien*).
- ζ. — Long extenseur commun (*Péronéo-sus-onguien*).
- ζ. — Court extenseur commun ou Pédieux (*Calcanéo-sus-onguien*).
- ι. — Long fléchisseur commun (*Tibio-sous-onguien*).
- λ. — Court fléchisseur commun (*Calcanéo-sous-onguien*). « Le Court fléchisseur s'unit aux tendons du Long fléchisseur et n'est point perforé. » (Note de G. Cuvier).
- μ. — Court abducteur du pouce.
- μ<sup>1</sup>. — Abducteur de l'index.
- ξ. — — du petit doigt (*Calcanéo-sus-phalangien du 1<sup>er</sup> orteil*).
- ρ. — Inter-osseux (*Métatarso-phalangiens latéraux*).


AD. FOUILLOX.

Fig. 1.  
Face latérale  
1<sup>re</sup> couche



Cuvier del.


Fig. 2.  
Face latérale  
2<sup>e</sup> couche



Ben. A. Gould del. Owen



Face inférieure  
1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> couche







# MYOLOGIE DE L'ORYCTÉROPE

(MYRMECOPHAGA CAPENSIS, Pall., Cuv., *Règ. an.*, t. I, p. 221).

## INDICATION DES MUSCLES.

### 1° Muscles peauciers.

(Pl. 254, fig. 1; — 255.)

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 4. — Thoraco-facien. | 5 <sup>c</sup> . — Portion latérale. |
| 5. — Dermo-humérien. | 5 <sup>d</sup> . — Portion ventrale. |

### 2° Muscles de la face et de l'os hyoïde.

(Pl. 254, fig. 2; — 255.)

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| j. — Masseter.                   | v. — Hyo-glosse.                      |
| q. — Digastrique.                | v <sup>2</sup> . — Cérato-glosse.     |
| r. — Mylo-hyoïdien.              | x. — Sterno-hyoïdien.                 |
| s. — Stylo-hyoïdien.             | x <sup>1</sup> . — Sterno-thyroïdien. |
| s <sup>2</sup> . — Stylo-glosse. |                                       |

### 3° Muscles de l'épine.

(Pl. 254, fig. 2; — 255 — 256, fig. 4, 2, 4.)

- |  |   |
|--|---|
| A. — Épineux du dos ou Tendino-épineux.                | L. — Grand complexe ( <i>Trachélo-occipitien</i> ).                     |
| B. — Long dorsal.                                      | L <sup>1</sup> . — Petit complexe ( <i>Trachélo-mastoïdien</i> ).       |
| E. — Demi-épineux du cou.                              | M <sup>2</sup> . — Grand droit postérieur ( <i>Axoïdo-occipitien</i> ). |
| G. — Inter-épineux.                                    | M <sup>1</sup> . — Petit droit latéral ( <i>Alloïdo-mastoïdien</i> ).   |
| I. — Splénus de la tête ( <i>Cervico-mastoïdien</i> ). | Y. — Ischio-caudien ( <i>Ischio-coccygien externe</i> ).                |

### 4° Muscles du tronc et des côtes.

(Pl. 254, fig. 2; — 255.)

- |   |  |
|---|--|
| 6. — Scalène, portion extérieure ou inférieure (portion du <i>Trachélo-costien</i> ). | 6 <sup>b</sup> . — <i>Idem</i> , portion intérieure ou supérieure (portion du <i>Trachélo-costien</i> ). |
|   | 13. — Grand oblique ( <i>Costo-abdominien</i> ).   |

### 5° Muscles du membre antérieur.

(Pl. 254, fig. 2; — 255 — 256, fig. 1, 5.)

- |  |  |   |
|--|--|---|
| a <sup>1</sup> . — Trapèze ou Cucullaire, portion cervicale                              | } (portion du <i>Dorso-sus-acromien</i> ). | +k. — Portion du Deltoïde ainsi annotée par G. Cuvier :<br>« Deltoïde à l'avant-bras. »           |
| a <sup>2</sup> . — <i>Idem</i> , portion dorsale   |  | n. — Sous-scapulaire ( <i>Scapulo-trochinien</i> ).   |
| b. — Sterno-mastoïdien ou trachélien.  |  | o. — Grand rond ( <i>Scapulo-humérien</i> ).  |
| b <sup>1</sup> . — Cléïdo-mastoïdien ou trachélien.                                      |  | q. — Coraco-brachial ( <i>Coraco-humérien</i> ).  |
| c <sup>1</sup> . — Rhomboïde du cou  | } (portion du <i>Dorso-trachélien</i> ).   | r. — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras ( <i>Scapulo-radial</i> ), portion coracoïdienne. |
| c <sup>2</sup> . — — du dos  |  | s. — Brachial interne ou Court fléchisseur ( <i>Huméro-cubitien</i> ).                            |
| d. — Omo- ou Acromio-trachélien.   |  | t. — Triceps ( <i>Scapulo-olécranien</i> ), portion scapulaire.                                   |
| g. — Grand dentelé ( <i>Scapulo-costien</i> ).   |  | t <sup>1</sup> . — <i>Idem</i> , portion humérale externe.  |
| h. — Sous-clavier ( <i>Costo-clavier</i> ) « allant à l'omoplate. » (Note de G. Cuvier.) |  | t <sup>2</sup> . — <i>Idem</i> , portion humérale interne.  |
| i. — Grand dorsal.   |  | t <sup>3</sup> . — <i>Idem</i> , portion allant au tendon du Grand dorsal, dite 4° Extenseur.     |
| j. — Grand pectoral, portion sternale ( <i>Sterno-humérien</i> ).                        |  | v. — Long supinateur ( <i>Huméro-sus-radial</i> ).  |
| j <sup>1</sup> . — <i>Idem</i> , portion costale et même ventrale.                       |  | x. — Rond pronateur ( <i>Épitrochlo-radial</i> ).   |
| k. — Deltoïde ( <i>Sous-acromio-humérien</i> ), portion claviculaire.                    |  | +x. — 2° Rond pronateur. (G. Cuvier.)   |
| k <sup>1</sup> . — <i>Idem</i> , portion scapulaire.                                     |  |   |

# MYOLOGIE DE L'ORYCTÉROPE.

- |  |   |
|--|---|
| 6. — Cubital interne ( <i>Épitrochlo-carpien</i> ).                                    | u. — Long abducteur du pouce ( <i>Cubito-sus-métacarpien</i> ). |
| 6 <sup>1</sup> . — — externe ( <i>Cubito-sus-métacarpien</i> ).                        | z. — Fléchisseur sublime ( <i>Épitrochlo-phalanginien</i> ).    |
| 7. — Radial interne ( <i>Épitrochlo-métacarpien</i> ).                                 | μ. — Fléchisseur profond, portion                               |
| 8. — 1 <sup>er</sup> Radial externe ( <i>Huméro-sus-métacarpien</i> ).                 | radiale   |
| ε. — Extenseur commun ( <i>Épicondylo-sus-phalangettien</i> ).                         | μ <sup>1</sup> . — <i>Idem</i> , portion humérale               |
| ε <sup>1</sup> . — — propre du petit doigt ( <i>Id. du petit doigt</i> ).              | μ <sup>2</sup> . — <i>Idem</i> , portion cubitale               |
| ε <sup>2</sup> . — — propre de l'index ( <i>Cubito-sus-phalangettien de l'index</i> ). | φ. — Lombricaux ( <i>Palmo-phalangiens</i> ).                   |

## 6° Muscles du membre postérieur.

(Pl. 254, fig. 2; — 255 — 256, fig. 1, 3, 4, 6.)

- |   |  |
|---|--|
| a. — Grand fessier ( <i>Sacro-fémorien</i> ).   | +q. — Accessoir coccygien du Biceps. (Note de G. Cuvier.)                                  |
| a <sup>1</sup> . — Moyen fessier ( <i>Ilio-trochantérien</i> ).   | r. — Demi-nerveux ou tendineux ( <i>Ischio-prétibien</i> ).                                |
| a <sup>2</sup> . — Petit fessier ( <i>Ilii-trochantérien</i> ).   | +r. — Accessoir bicipital du Demi-nerveux. (Note de G. Cuvier.)                            |
| b. — Carré de la cuisse ( <i>Ischio-trochantérien</i> ).  | s. — Demi-membraneux ( <i>Ischio-sous-tibien</i> ).  |
| c. — Obturateur interne ( <i>Sous-pubio-trochantérien interne</i> ). « L'Obturateur interne seulement vient de la face interne de la branche postérieure à la tubérosité de l'Ischion. » (Note de G. Cuvier.) | t. — Couturier ( <i>Ileo-prétibien</i> ).  |
| d. — Obturateur externe ( <i>Sous-pubio-trochantérien externe</i> ).  | u. — Grêle ou Droit interne ( <i>Pubio-prétibien</i> ).                                    |
| e. — Jumeau supérieur   | x. — Fascia lata ( <i>Ileo-fascien</i> ).  |
| e <sup>1</sup> . — Jumeau inférieur   | α. — Gastrocnémien externe   |
|   | α <sup>1</sup> . — — interne   |
| « Les Jumeaux viennent du Sacrum; le Jumeau postérieur (inférieur) a aussi des fibres de la tubérosité de l'Ischion. » (Note de G. Cuvier.)   | ε. — Soléaire ( <i>Tibio-calcaneien</i> ).   |
| f. — Pyramidal ( <i>Sacro-trochantérien</i> ).  | γ. — Plantaire grêle ( <i>Fémoro-calcaneien</i> ).   |
| g. — Petit psoas ( <i>Prélombo-pubien</i> ).  | δ. — Tibial ou Jambier antérieur ( <i>Tibio-sus-tarsien</i> ).                             |
| h. — Grand psoas ( <i>Prélombo-trochantinien</i> ).   | δ <sup>1</sup> . — — postérieur ( <i>Tibio-sous-tarsien</i> ).                             |
| i. — Iliaque ( <i>Ilio-trochantinien</i> ).   | ε. — Long péronier ( <i>Péronéo-sous-tarsien</i> ).  |
| k. — 1 <sup>er</sup> Pectiné  | ε <sup>1</sup> . — Moyen péronier ( <i>Péronéo-sus-métatarsien</i> ).                      |
| k <sup>1</sup> . — 2 <sup>e</sup> Pectiné   | ε <sup>2</sup> . — Court péronier ( <i>Péronéi-sus-métatarsien</i> ).                      |
| (portion des <i>Pubo-fémoriens</i> ).   | ζ. — Long extenseur commun ( <i>Péronéo-sus-onguien</i> ).                                 |
| l. — 1 <sup>er</sup> ou Court adducteur ( <i>Sous-pubo-fémorien</i> ).  | ζ <sup>1</sup> . — — du pouce ( <i>Péronéi-sus-onguien</i> ).                              |
| « Il n'y a qu'un Adducteur. » (Note de G. Cuvier.)  | θ. — Court extenseur commun ou Pédieux ( <i>Calcaneo-sus-onguien</i> ).                    |
| l'. — Carré de la cuisse (Planche 256, fig. 4).   | ι. — Long fléchisseur commun ( <i>Tibio-sous-onguien</i> ).                                |
| m. — Vaste externe  | κ. — Court fléchisseur commun ( <i>Calcaneo-sous-onguien</i> ).                            |
| n. — Vaste interne  | ξ. — Abducteur du petit doigt ( <i>Calcaneo-sus-phalangien du 1<sup>er</sup> orteil</i> ). |
| p. — Grêle ou Droit antérieur, ou 4 <sup>e</sup> Extenseur ( <i>Ileo-rotulien</i> ).  | ο. — Chair carrée ou accessoir du fléchisseur commun.                                      |
| q. — Biceps ( <i>Ischio-péronien</i> ).   | ϕ. — Ischio-caverneux.   |

AD. FOILLON.

Fig. 1.  
Face latérale  
peaucier.





Fig. 2.  
Face latérale  
1<sup>re</sup> couche.





Face ventrale,  
peaucier et  
1<sup>re</sup> couche.








Fig. 4.  
Cuisse, face interne  
couche profonde.




Fig. 3.  
Cuisse, face externe,  
couche profonde.




Fig. 5.  
Face interne de l'épaule  
et du bras.





Fig. 6.  
Face postérieure de la jambe,  
et face inférieure du pied.







# MYOLOGIE

## DU FOURMILIER DIDACTYLE

(MYRMECOPHAGA DIDACTYLA, Lin., Cuv., *reg. an.*, t. I, p. 223).

### INDICATION DES MUSCLES.

#### 1<sup>o</sup> Muscles peauciers.

(Pl. 257, fig. 1; — 258, fig. 1.)

5<sup>e</sup>. — Portion latérale.

| 5<sup>d</sup>. — Portion ventrale.

#### 2<sup>o</sup> Muscles de la tête et de l'os hyoïde.

(Pl. 258, fig. 1.)

r. — Mylo-hyoïdien.

| a<sup>2</sup>. — Sterno-maxillaire.

#### 3<sup>o</sup> Muscles de l'épine.

(Pl. 257, fig. 1 et 2.)

B. — Long dorsal.

C. — Sacro-lombaire.

E. — Demi-épineux du cou.

| I<sup>1</sup>. — Splénus du cou (*Dorso-trachélien*).

| L. — Grand complexe (*Trachélo-occipiten*).

#### 4<sup>o</sup> Muscles du tronc et des côtes.

(Pl. 257, fig. 2.)

6. — Scalène, portion extérieure ou inférieure (*Trachélo-costien*).

| 6<sup>b</sup>. — Scalène, portion intérieure ou supérieure (*Trachélo-costien*).

6<sup>a</sup>. — Scalène, portion moyenne (*Trachélo-costien*).

| 13. — Grand oblique (*Costo-abdominien*).

#### 5<sup>o</sup> Muscles du membre antérieur.

(Pl. 257, fig. 1, 2, 3; — 258, fig. 1.)

a<sup>1</sup>. — Trapèze ou Cucullaire, portion cervicale

a<sup>2</sup>. — *Idem*, portion dorsale

b. — Sterno-mastoïdien ou trachélien.

b<sup>1</sup>. — Cléido-mastoïdien ou trachélien.

c<sup>2</sup>. — Rhomboïde du dos (portion du *Dorso-trachélien*).

g. — Grand dentelé (*Scapulo-costien*). Dans la pl. 257, fig. 1, on voit en g la 4<sup>re</sup> languette de ce muscle.

i. — Grand dorsal.

j. — Grand pectoral, portion sternale (*Sterno-humérien*).

j<sup>1</sup>. — *Idem*, portion costale et même ventrale.

j<sup>2</sup>. — *Idem*, portion profonde, dite Moyen ou Petit pectoral.

j<sup>3</sup>. — *Idem*, 4<sup>e</sup> portion. Cette 4<sup>e</sup> portion est indiquée par erreur sous le signe j<sup>1</sup>, sur le côté gauche de la fig. 1, pl. 258.

k. — Deltoïde (*Sous-acromio-humérien*), portion claviculaire.

n. — Sous-scapulaire (*Scapulo-trochinien*).

o. — Grand rond (*Scapulo-humérien*).

r. — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras (*Scapulo-radial*), portion coracoïdienne.

s. — Brachial interne ou Court fléchisseur (*Huméro-cubiten*).

t. — Triceps (*Scapulo-olécranien*), portion scapulaire.

t<sup>1</sup>. — *Idem*, portion humérale externe.

t<sup>2</sup>. — *Idem*, portion humérale interne.

t<sup>3</sup>. — *Idem*, portion allant au tendon du Grand dorsal, dite 4<sup>e</sup> Extenseur.

+t<sup>2</sup>. — Extenseur venant de l'épine de l'omoplate (ainsi indiqué par G. Cuvier).

v. — Long supinateur (*Huméro-sus-radial*).

v<sup>1</sup>. — Court supinateur (*Épicondylo-sus-radial*).

∞. — Muscle propre. (G. Cuvier.) C'est un 2<sup>e</sup> Long supinateur.

x. — Rond pronateur (*Épitrochlo-radial*).

z. — Palmaire grêle (*Épitrochlo-palmaire*).

ε. — Cubital interne (*Épitrochlo-carpien*).

ε<sup>1</sup>. — — — — — externe (*Cubito-sus-métacarpien*).

γ. — Radial interne (*Épitrochlo-métacarpien*).

δ. — 1<sup>er</sup> Radial externe (*Huméro-sus-métacarpien*).

ε. — Extenseur commun (*Épicondylo-sus-phalangien*).

ε<sup>1</sup>. — *Idem*, propre du petit doigt (*Idem du petit doigt*).

ι. — Long abducteur du pouce (*Cubito-sus-métacarpien*).

κ. — Fléchisseur sublime du médius (*Épitrochlo-phalangien*).

κ<sup>1</sup>. — Fléchisseur sublime du 1<sup>er</sup> doigt.

μ. — Fléchiss. profond, portion radiale

μ<sup>1</sup>. — — — — — portion humérale

μ<sup>2</sup>. — — — — — portion cubitale

σ. — Court fléchiss. du petit doigt (*Carpo-métacarpien*).

(portion du *Dorso-sus-acromien*).

(*Cubito-sous-onguien*).

# MYOLOGIE DU FOURMILIER DIDACTYLE.

- |  |   |
|--|---|
| v. — Abducteur du petit doigt ( <i>Carpo-phalangien</i> ). | z. — Inter-osseux supérieurs ou externes ( <i>Métacarpus-phalangiens</i> ). |
| +. — Abaisseur du pisiforme (ainsi dénommé par G. Cuvier). |   |

## 6° Muscles du membre postérieur.

(Pl. 257, fig. 1, 2, 4; — 258, fig. 1, 2.)

- |  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| a. — Grand fessier ( <i>Sacro-fémorien</i> ).  | α. — Gastrocnémien externe   | } ( <i>Bi-fémoro-calcanien</i> ). |
| a'. — Moyen fessier ( <i>Ilio-trochantérien</i> ).                                   | α'. — — interne  |                                   |
| b. — Carré de la cuisse ( <i>Ischio-trochantérien</i> ).                             | β. — Soléaire ( <i>Tibio-calcanien</i> ).  |                                   |
| i. — Iliaque ( <i>Ilio-trochantinien</i> ).  | γ. — Plantaire grêle ( <i>Fémoro-calcanien</i> ).  |                                   |
| k. — 1 <sup>er</sup> Pectiné (portion des <i>Pubo-fémoriens</i> ).                   | δ. — Tibial ou Jambier antérieur ( <i>Tibio-sus-tarsien</i> ).                             |                                   |
| l. — 1 <sup>er</sup> ou Court adducteur ( <i>Sous-pubo-fémorien</i> ).               | δ'. — — postérieur ( <i>Tibio-sous-tarsien</i> ).  |                                   |
| m. — Vaste externe   | ε. — Long péronier ( <i>Péronéo-sous-tarsien</i> ).  |                                   |
| n. — Vaste interne   | ε'. — Moyen péronier ( <i>Péronéo-sus-métatarsien</i> ).                                   |                                   |
| p. — Grêle ou Droit antérieur, ou 4 <sup>e</sup> Extenseur ( <i>Iléo-rotulien</i> ). | ε <sup>2</sup> . — Court péronier ( <i>Péronéo-sus-métatarsien</i> ).                      |                                   |
| q. — Biceps ( <i>Ischio-péronien</i> ).  | ζ. — Long extenseur commun ( <i>Péronéo-sus-onguien</i> ).                                 |                                   |
| q <sup>2</sup> . — Accessoire du Biceps. (Note de G. Cuvier.)                        | ζ. — Court extenseur commun ou Pédieux ( <i>Calcanéo-sus-onguien</i> ).                    |                                   |
| r. — Demi-nerveux ou tendineux ( <i>Ischio-prétibien</i> ).                          | ι. — Long fléchisseur commun ( <i>Tibio-sous-onguien</i> ).                                |                                   |
| r'. — Accessoire fémoral du Demi-nerveux. (Note de G. Cuvier.)                       | ι'. — — du pouce ( <i>Tarso-phalangien</i> ).  |                                   |
| s. — Demi-membraneux ( <i>Ischio-sous-tibien</i> ).                                  | λ. — Court fléchisseur du pouce ( <i>Tarso-phalangien du pouce</i> ).                      |                                   |
| t. — Couturier ( <i>Iléo-prétibien</i> ).  | ξ. — Abducteur du petit doigt ( <i>Calcanéo-sus-phalangien du 1<sup>er</sup> orteil</i> ). |                                   |
| u. — Grêle ou Droit interne ( <i>Pubio-prétibien</i> ).                              |  |                                   |
| v. — Poplité ( <i>Poplito-tibien</i> ).  |  |                                   |

AD. FOCHLON.

Fig. 1.

Face latérale  
1<sup>re</sup> couche.




Fig. 2.

Face latérale  
2<sup>e</sup> couche.



Fig. 4.

Face postérieure  
de la jambe.




Fig. 3.

Face interne de  
l'extrémité antérieure  
2<sup>e</sup> couche de l'avant bras.






Fig. 1.

Face abdominale.





Fig. 2.

Face interne de la cuisse.  
2<sup>e</sup> couche





# MYOLOGIE DU TATOU A SIX BANDES

(DASYPUS SEXCINCTUS, Lin., Cuv., *Rég. an.*, t. I, p. 220).

## INDICATION DES MUSCLES.

### 1° Muscles peauciers.

(Pl. 259, fig. 1; — 260.)

- 3<sup>a</sup>. — Dorso-occipitien.  
4. — Thoraco-facien.

5. — Dermo-humérien.  
5<sup>e</sup>. — Portion latérale.

### 2° Muscles de la face et de l'os hyoïde.

(Pl. 259, fig. 2; — 260.)

- j. — Masseter.  
q. — Digastrique.  
r. — Mylo-hyoïdien.  
s. — Stylo-hyoïdien.

- x. — Sterno-hyoïdien.  
x<sup>1</sup>. — Sterno-thyroïdien.  
y<sup>1</sup>. — Thyro-pharyngien.  
+. — Sterno-maxillaire,

### 3° Muscles de l'épine.

(Pl. 259, fig. 3; — 260.)

- B. — Long dorsal.  
C. — Sacro-lombaire.  
E. — Demi-épineux du cou.  
E<sup>1</sup>. — Demi-épineux du dos.  
I. — 1<sup>er</sup> Splénus.  
+I. — 2<sup>e</sup> Splénus.

- I<sup>1</sup>. — Petit complexus (*Trachélo-mastoïdien*) (avec ce signe ? par G. Cuvier).  
L. — Grand complexus (*Trachélo-occipitien*).  
M<sup>2</sup>. — Grand droit postérieur (*Axoido-occipitien*).  
Y. — Ischio-caudien (*Ischio-coccygien externe*).

### 4° Muscles du tronc et des côtes.

(Pl. 259, fig. 3; — 260.)

6. — Scalène, portion extérieure ou inférieure (portion du *Trachélo-costien*).  
13. — Grand oblique (*Costo-abdominien*).

14. — Petit oblique ou Oblique interne (*Ileo-abdominien*).

### 5° Muscles du membre antérieur.

(Pl. 259, fig. 1 et 2; — 260.)

- a. — Trapèze ou Cucullaire, portion occipitale  
a<sup>1</sup>. — *Idem*, portion cervicale  
a<sup>2</sup>. — *Idem*, portion dorsale  
b. — Sterno-mastoïdien ou trachélien.  
b<sup>1</sup>. — Cléïdo-mastoïdien ou trachélien.  
c. — Rhomboïde de la tête  
c<sup>1</sup>. — du cou  
c<sup>2</sup>. — du dos  
(*Dorso-trachélien*).  
g. — Grand dentelé (*Scapulo-costien*).  
h. — Sous-clavier (*Costo-clavien*).  
i. — Grand dorsal.  
j. — Grand pectoral, portion sternale (*Sterno-humérien*).  
j<sup>2</sup>. — *Idem*, port. profonde, dite Moyen ou Petit pectoral.  
k. — Deltoïde (*Sous-acromio-humérien*), portion claviculaire.  
k<sup>1</sup>. — *Idem*, portion scapulaire.  
n. — Sous-scapulaire (*Scapulo-trochinien*).  
q. — Coraco-brachial (*Coraco-humérien*).  
r. — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras (*Scapulo-radien*), portion coracoïdienne.

- t. — Triceps (*Scapulo-olécranien*), portion scapulaire.  
t<sup>1</sup>. — *Idem*, portion humérale externe.  
t<sup>2</sup>. — *Idem*, portion humérale interne.  
t<sup>3</sup>. — *Idem*, portion allant au tendon du Grand dorsal, dite 4<sup>e</sup> Extenseur.  
u. — Anconé (*Épicondylo-cubitien*) externe.  
x. — Rond pronateur (*Épitrochlo-radien*).  
ε. — Cubital interne (*Épitrochlo-carpien*).  
ε<sup>1</sup>. — externe (*Cubito-sus-métacarpien*).  
γ. — Radial interne (*Épitrochlo-métacarpien*).  
δ. — 1<sup>er</sup> Radial externe (*Huméro-sus-métacarpien*).  
ε. — Extenseur commun (*Épicondylo-sus-phalangettien*).  
ε<sup>1</sup>. — propre du petit doigt (*Id. du petit doigt*).  
ε<sup>2</sup>. — propre de l'index (*Cubito-sus-phalangettien de l'index*).  
+ε<sup>1</sup>. — *Idem*, propre du 4<sup>e</sup> doigt. (G. Cuvier.)  
τ. — Long abducteur du pouce (*Cubito-sus-métacarpien*).  
ζ. — Fléchisseur sublime (*Épitrochlo-phalanginien*).  
μ. — Fléchisseur profond, portion cubitale (portion du *Cubito-sous-onguien*).  
φ. — Lombricaux (*Palmo-phalangiens*).


AD. FOCHLON.






Muscle peaucier

Face latérale  
1<sup>re</sup> couche




Muscles de l'épine  
et 2<sup>e</sup> couche de la cuisse





Face inférieure du corps,  
1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> couches.





# MYOLOGIE DU TAMANDUA

(MYRMECOPHAGA TAMANDUA, Cuv., *Rég. an.*, t. I, p. 223).

## INDICATION DES MUSCLES.

### 1° Muscles de la face et de l'os hyoïde.

(Pl. 262.)

r. — Mylo-hyoïdien.  
t. — Génio-glosse.  
t'. — Génio-hyoïdien.  
v. — Hyo-glosse.  
x. — Sterno-hyoïdien.

x<sup>1</sup>. — Sterno-thyroïdien.  
x<sup>2</sup>. — Sterno-glosse (ainsi nommé par G. Cuvier). Au côté externe de ce muscle on voit le Sterno-maxillaire.

### 2° Muscles de l'épine.

(Pl. 261, fig. 1, 2, 3.)

A. — Épineux du dos ou Tendino-épineux.  
B. — Long dorsal.  
C. — Sacro-lombaire.  
E. — Demi-épineux du cou.  
E'. — Demi-épineux du dos.  
I. — Splénus de la tête (*Cervico-mastoïdien*).

I'. — Splénus du cou (*Dorso-trachélien*).  
L. — Grand complexus (*Trachélo-occipitien*).  
L'. — Petit complexus (*Trachélo-mastoïdien*).  
M<sup>2</sup>. — Grand droit postérieur (*Axoïdo-occipitien*).  
N. — Petit oblique ou Oblique supérieur (*Atloïdo-post-mastoïdien*).

### 4° Muscles du tronc et des côtes.

(Pl. 261, fig. 1, 2, 3; — 262 — 263, fig. 1.)

6. — Scalène, portion extérieure ou inférieure  
6<sup>2</sup>. — *Idem*, portion intér. ou supér. } (portion du *Trachélo-costien*).

13. — Grand oblique (*Costo-abdominien*).  
15. — Droits du bas-ventre (*Sterno-pubiens*).

### 5° Muscles du membre antérieur.

(Pl. 261, fig. 1, 2, 3; — 262 — 263, fig. 2, 3.)

a. — Trapèze ou Cucullaire, portion occipitale  
a<sup>1</sup>. — *Idem*, portion cervicale  
a<sup>2</sup>. — *Idem*, portion dorsale } (*Dorso-sus-acromien*).  
b. — Sterno-mastoïdien.  
c<sup>2</sup>. — Rhomboïde du dos (portion du *Dorso-trachélien*).  
Ce muscle est marqué en points de c<sup>2</sup> en c<sup>2</sup>.  
d. — Omo- ou Acromio-trachélien.  
g. — Grand dentelé (*Scapulo-costien*).  
i. — Grand dorsal.  
j. — Grand pectoral, portion sternale (*Sterno-humérien*).  
j<sup>1</sup>. — — — — — portion costale ou même ventrale.  
j<sup>2</sup>. — — — — — portion profonde, dite Moyen ou Petit pectoral.  
k. — Deltoïde (*Sous-acromio-humérien*).  
a+k. — Deltoïdo-trapèze.  
l. — Sur-épineux (*Sus-scapulo-trochitérien*).  
m. — Sous-épineux (*Sous-scapulo-trochitérien*).  
n. — Sous-scapulaire (*Scapulo-trochinien*).  
o. — Grand rond (*Scapulo-humérien*).  
q. — Coraco-brachial (*Coraco-humérien*).  
r. — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras (*Scapulo-radien*), portion coracoïdienne.  
t. — Triceps (*Scapulo-olécranien*), portion scapulaire.  
t'. — *Idem*, portion humérale externe.

t<sup>2</sup>. — *Idem*, portion humérale interne.  
t<sup>3</sup>. — *Idem*, portion allant au tendon du Grand dorsal, dite 4<sup>e</sup> Extenseur.  
u. — Anconé (*Épicondylo-cubitien*) externe.  
v. — Long supinateur (*Huméro-sus-radien*).  
+. — Muscle propre, ainsi indiqué par G. Cuvier. C'est un 2<sup>e</sup> Long supinateur.  
v<sup>1</sup>. — Court supinateur (*Épicondylo-sus-radien*).  
x. — Rond pronateur (*Épitrochlo-radien*).  
x<sup>1</sup>. — Carré pronateur (*Cubito-radien*).  
z. — Palmaire grêle (*Épitrochlo-palmaire*).  
ε. — Cubital interne (*Épitrochlo-carpien*).  
ε<sup>1</sup>. — — — — — externe (*Cubito-sus-métacarpien*).  
γ. — Radial interne (*Épitrochlo-métacarpien*).  
δ. — 1<sup>er</sup> Radial externe (*Huméro-sus-métacarpien*).  
ε. — Extenseur commun (*Épicondylo-sus-phalangettien*).  
ε<sup>1</sup>. — (Pl. 261, fig. 1.) Extenseur propre de l'annulaire.  
ε<sup>1</sup>. — (Pl. 263, fig. 3.) Extenseur propre du médian et de l'index.  
+ε. — Languette de l'Extenseur commun à l'Extenseur propre du médian. (G. Cuvier.)  
u. — Long abducteur du pouce (*Cubito-sus-métacarpien*).  
z. — Fléchisseur sublime (*Épitrochlo-phalanginien*).

# MYOLOGIE DU TAMANDUA.

- μ. — Fléchisseur profond, portion cubitale (portion du *Cubito-sous-onguien*). « Le Fléchisseur sublime n'a qu'un tendon pour le médus, le profond n'en a pas pour le petit doigt. » (Note de G. Cuvier.)
- ν. — Court fléchisseur du pouce (*Carpo-phalangien*).
- σ. — Court fléchisseur du petit doigt (*Carpo-métacarpien*).
- υ. — Abducteur du petit doigt (*Carpo-phalangien*).
- φ. — Lombricaux (*Palmo-phalangiens*).

## 6° Muscles du membre postérieur.

(Pl. 261, fig. 1 et 2; — 262 — 263, fig. 1 et 2.)

- a. — Grand fessier (*Sacro-fémorien*).
- a<sup>1</sup>. — Moyen fessier (*Ilio-trochantérien*).
- a<sup>2</sup>. — Petit fessier (*Ilii-trochantérien*).
- b. — Carré de la cuisse (*Ischio-trochantérien*).
- c, c. — « Muscle tenant lieu de l'Obturbateur interne et des Jumeaux, mais venant seulement de la face externe de l'ischion. » (Note de G. Cuvier.)
- d. — Obturbateur externe (*Sous-pubio-trochantérien externe*).
- g. — Petit Psoas (*Prélombo-pubien*).
- h. — Grand psoas (*Prélombo-trochantinien*).
- i. — Iliaque (*Ilio-trochantinien*).
- k. — 1<sup>er</sup> Pectiné (portion du *Pubo-fémorien*).
- l. — 1<sup>er</sup> ou Court adducteur (*Sous-pubo-fémorien*).
- l<sup>1</sup>. — 2<sup>o</sup> ou Moyen adducteur (*Sous-pubi-fémorien*).
- l<sup>2</sup>. — 3<sup>o</sup> ou Long adducteur (*Ischii-fémorien*).
- l<sup>3</sup>. — « 4<sup>o</sup> Adducteur. » (G. Cuvier.)
- m. — Vaste externe } (portion du *Tri-fémoro-rotulien*).
- n. — Vaste interne }
- p. — Grêle ou Droit antérieur, ou 4<sup>o</sup> Extenseur (*Iléo-rotulien*).
- q. — Biceps (*Ischio-péronien*).
- q+ et + q. — « Accessoir coccygien du Biceps. » (G. Cuvier.)
- r. — Demi-nerveux ou tendineux (*Ischio-prétibien*).
- +r. — « Accessoir coccygien du Demi-nerveux. » (G. Cuvier.)
- s. — Demi-membraneux (*Ischio-sous-tibien*).
- t. — Couturier (*Iléo-prétibien*).
- u. — Grêle ou Droit interne (*Pubio-prétibien*).
- v. — Poplité (*Poplito-tibien*).
- z. — Gastrocnémien externe } (*Bi-fémoro-calcanien*).
- z<sup>1</sup>. — — interne }
- z. — Soléaire (*Tibio-calcanien*).
- γ. — Plantaire grêle (*Fémori-calcanien*).
- δ. — Tibial ou Jambier antérieur (*Tibio-sus-tarsien*).
- δ<sup>1</sup>. — — postérieur (*Tibio-sous-tarsien*).
- ε. — Long péronier (*Péronéo-sus-tarsien*).
- ε<sup>1</sup>. — Moyen péronier (*Péronéo-sus-métatarsien*).
- ε<sup>2</sup>. — Court péronier (*Péronéi-sus-métatarsien*).
- ζ. — Long extenseur commun (*Péronéo-sus-onguien*).
- ζ. — Court extenseur commun ou Pédieux (*Calcanéo-sus-onguien*).
- ι. — Long fléchisseur commun (*Tibio-sous-onguien*).
- ι<sup>1</sup>. — — du pouce (*Tarso-phalangien*).
- κ. — Court fléchisseur commun (*Calcanéo-sous-onguien*). « Le Court fléchisseur s'insère au côté externe des doigts et n'est pas perforé; il n'y en a pas pour le pouce. » (Note de G. Cuvier.)
- λ. — Court fléchisseur du pouce (*Tarso-phalangien du pouce*).
- ν. — Adducteur oblique du pouce (*Métatarso-phalangien du 1<sup>er</sup> orteil*).
- ο. — Chair carrée ou Accessoir du fléchisseur commun.

AD. FOCILLON.

Fig. 1.

Face latérale,  
1<sup>re</sup> couche.




Fig. 2.

Muscles de l'Épine,  
face externe de la cuisse,  
2<sup>e</sup> couche.





Fig. 3.

Muscles de l'Épine,  
couche profonde












Fig. 1.

Face postérieure de la cuisse,  
couche profonde.  
Face postérieure de la jambe,  
Face inférieure du pied.




Fig. 3.

Face externe de l'avant-bras  
2<sup>me</sup> couche.





Fig. 2.

Face interne du bras  
et de l'avant bras.





# MYOLOGIE DE L'ORNITHORHYNQUE

(ORNITHORHYNCHUS PARADOXUS, Blumenbach, *Cuv., Règ. an.*, t. 1, p. 226).

Cette myologie, laissée inachevée par G. Cuvier, a été complétée d'après de nouvelles dissections que les dessins ajoutés ont eu pour but de reproduire.

## SQUELETTE.

(Pl. 264, fig. 1, 2, 3.)

### 1° Tête.

ms. — Maxillaire supérieur.	mi. — Maxillaire inférieur.
im. — Inter-maxillaire.	j. — Jugal ou Arcade zygomatique.

### 2° Tronc.

vcv. — Vertèbres cervicales.	ved. — Vertèbres caudales
vdv. — dorsales.	ccc. — Côtes.
vl. — lombaires.	st. — Sternum proprement dit.
vs. — sacrées.	

### 3° Membre antérieur.

kk. — Deuxième pièce du Sternum.	ffn. — Os de la fourchette; n, son manche. Cet os est la première pièce du Sternum.
om. — Omoplate.	ww. — Clavicules.
e. — Apophyse de l'Omoplate qui porte la fourchette et qui représente l'Acromion.	m. — Os Épicoracoïdien.
hh. — (Fig. 2.) Cavité glénoïde.	h. — (Fig. 1.) Humérus.
ii. — Os articulé sur le col de l'Omoplate et sur la deuxième pièce du Sternum; il représente l'os Coracoïdien.	cu. — Cubitus.
g. — Col de l'Omoplate.	ra. — Radius.
	c. — Carpe.
	mt. — Métacarpe.
	dd'd'. — Phalanges.

### 4° Membre postérieur.

il. — Os Iliaque.	ti. — Tibia.
is. — Ischion.	pe. — Péroné.
pp. — Os Pubis.	t. — Tarse.
mp. — Os Marsupiaux.	mt. — Métatarse.
f. — Fémur.	dd'd'. — Phalanges
ro. — Rotule.	

## INDICATION DES MUSCLES.

### 1° Muscles peauciers.

(Pl. 265, fig. 1 et 2; — 266, fig. 1 et 2; — 267 — 269, fig. 1, 2, 3, 4, 5.)

2. — Facien.	cier, et va se fixer à l'os hyoïde. » (Note de G. Cuvier.)
3 <sup>a</sup> . — Dorso-occipitien.	
4. — Thoraco-facien.	5. — Dermo-humérien.
4 <sup>l</sup> . — Peauciers. Ce sont les extrémités des muscles désignés dans la planche 267 par 4+ et r <sup>++</sup> , avec les notes de G. Cuvier.	5 <sup>a</sup> . — Portion scapulaire.
4+. — « Muscle qui s'insère à la face interne du Peau-	5 <sup>b</sup> . — dorsale.
	5 <sup>c</sup> . — latérale.
	5 <sup>d</sup> . — ventrale.

## MYOLOGIE DE L'ORNITHORHYNQUE.

### 2° Muscles de la face et de l'os hyoïde.

(Pl. 265, fig. 2; — 266, fig. 1, 2, 3; — 267.)

- |  |  |
|--|--|
| <p><i>b.</i> — Temporal ou Crotaphyte.<br/> <i>j.</i> — Masseter.<br/> <i>n</i><sup>1</sup>. — « Muscle qui s'insère d'une part à l'os hyoïde et au raphé sous-maxillaire, et de l'autre, par un tendon aponevrotique, à la lèvre inférieure. » (Note de G. Cuvier.)<br/> <i>p</i><sup>1</sup>. — Ptérygoïdien interne.<br/> <i>q.</i> — Digastrique.<br/> <i>r.</i> — « Fibres transverses du Peaucier qui s'intercalent entre les fibres longitudinales externes situées en arrière et les fibres longitudinales internes <i>r</i>+, pl. 267, qui recouvrent la poche buccale; ces fibres transverses tiennent lieu du Mylo-hyoïdien. » (Note de G. Cuvier.)</p> | <p><i>r</i>+. — Peaucier.<br/> <i>r</i>++ — « Faisceau qui se détache de la partie postérieure de la poche, et qui se porte transversalement à l'os hyoïde. » (Note de G. Cuvier.)<br/> <i>s.</i> — Stylo-hyoïdien.<br/> <i>t</i><sup>2</sup>. — « Muscle qui vient du raphé sous-maxillaire et qui va se fixer à la face externe de la mâchoire inférieure. » (Note de G. Cuvier.)<br/> <i>v</i>+. — ?<br/> <i>v</i>++ — ?<br/> <i>x.</i> — Sterno-hyoïdien.<br/> <i>y.</i> — Thyro-hyoïdien.</p> |
|--|--|

### 3° Muscles de l'épine.

(Pl. 266, fig. 4; — 269, fig. 4, 2, 7, 8, 9.)

- |  |   |
|--|---|
| <p><i>I</i><sup>1</sup>. — Splénus du cou (<i>Dorso-trachélien</i>).<br/> <i>L.</i> — Grand complexus (<i>Trachélo-occipiten</i>).<br/> <i>L</i><sup>1</sup>. — Petit complexus (<i>Trachélo-mastoïdien</i>).<br/> <i>M</i><sup>2</sup>. — Grand droit postérieur (<i>Axoïdo-occipiten</i>).</p> | <p><i>M</i><sup>3</sup>. — Petit droit postérieur (<i>Alloïdo-occipiten</i>).<br/> <i>Q.</i> — Ischio-caudien (<i>Ischio-coccygien externe</i>).<br/> <i>R.</i> — Sacro-coccygien supérieur (<i>Lombo-sus-caudien</i>).<br/> <i>R</i><sup>1</sup>. — Sacro-coccygien inférieur (<i>Lombo-sous-caudien</i>).</p> |
|--|---|

### 4° Muscles du tronc et des côtes.

(Pl. 265, fig. 2; — 269, fig. 2 et 3.)

- |   |  |
|---|--|
| <p>13. — Grand oblique (<i>Costo-abdominien</i>).</p> | <p>15. — Droits du bas-ventre (<i>Sterno-pubiens</i>).</p> |
|---|--|

### 5° Muscles du membre antérieur.

- |   |   |
|---|---|
| <p><i>a.</i> — Trapèze ou Cuculaire, portion occipitale<br/> <i>a</i><sup>1</sup>. — <i>Idem</i>, portion cervicale<br/> <i>a</i><sup>2</sup>. — <i>Idem</i>, portion dorsale<br/> <i>b.</i> — Sterno-mastoïdien ou trachélien.<br/> <i>b</i><sup>1</sup>. — Cléido-mastoïdien ou trachélien.<br/> <i>c.</i> — Rhomboïde de la tête<br/> <i>c</i><sup>1</sup>. — du cou<br/> <i>c</i><sup>2</sup>. — du dos<br/> <i>d.</i> — Omo- ou Acromio-trachélien.<br/> <i>d</i><sup>1</sup>. — Releveur ou Angulaire de l'Omoplate (<i>Trachélo-scapulien</i>).<br/> <i>e.</i> — Omo-hyoïdien.<br/> <i>g.</i> — Grand dentelé (<i>Scapulo-costien</i>).<br/> <i>i.</i> — Grand dorsal.<br/> <i>i</i><sup>1</sup>. — <i>Idem</i>, portion costale; G. Cuvier la désigne ainsi par opposition à la portion antérieure et supérieure, qu'il appelle portion spinale.<br/> <i>j.</i> — Grand pectoral, portion sternale (<i>Sterno-humérien</i>).<br/> <i>j</i><sup>1</sup>. — <i>Idem</i>, portion costale et même ventrale.<br/> <i>j</i><sup>2</sup>. — <i>Idem</i>, portion profonde dite Moyen ou Petit pectoral.<br/> <i>k.</i> — Deltoïde (<i>Sous-acromio-humérien</i>).<br/> <i>m.</i> — Sous-épineux (<i>Sous-scapulo-trochitérien</i>).<br/> <i>n.</i> — Sous-scapulaire (<i>Scapulo-trochinien</i>).<br/> <i>o.</i> — Grand rond (<i>Scapulo-humérien</i>).<br/> <i>q.</i> — Coraco-brachial (<i>Coraco-humérien</i>).</p> | <p><i>q</i><sup>1</sup>. — « Muscle allant de la lame coracoïdienne du précédent au milieu du Radius. » (Note de G. Cuvier.)<br/> <i>r.</i> — Biceps ou Long fléchisseur de l'avant-bras (<i>Scapuloradien</i>), portion coracoïdienne et portion bicipitale.<br/> <i>r</i>+. — Branche antérieure ou Accessoir du biceps.<br/> <i>s.</i> — Brachial interne ou antérieur, ou Court fléchisseur (<i>Huméro-cubitien</i>).<br/> <i>t.</i> — Triceps (<i>Scapulo-olécranien</i>), portion scapulaire.<br/> <i>t</i><sup>1</sup>. — <i>Idem</i>, portion humérale externe.<br/> <i>t</i><sup>1</sup>. — Extenseur du coude. (G. Cuvier.)<br/> <i>u.</i> — Anconé (<i>Épicondylo-cubitien</i>) externe.<br/> <i>ε.</i> — Cubital interne (<i>Épitrochlo-carpien</i>).<br/> <i>ε</i><sup>1</sup>. — Cubital externe (<i>Cubito-sus-métacarpien</i>).<br/> <i>ε.</i> — Extenseur commun (<i>Épicondylo-sus-phalangétien</i>).<br/> <i>ε</i><sup>1</sup>. — <i>Idem</i> propre du petit doigt (<i>Id. du petit doigt</i>).<br/> <i>z.</i> — Fléchisseur sublime (<i>Épitrochlo-phalangenien</i>).<br/> <i>μ.</i> — Fléchisseur profond, portion radiale<br/> <i>μ.</i> — <i>Idem</i>, portion humérale<br/> <i>ξ.</i> — Court abducteur du pouce (<i>Carpo-sus-phalangien</i>).<br/> <i>σ.</i> — Court fléchisseur du petit doigt (<i>Carpo-métacarpien</i>).<br/> <i>υ</i><sup>1</sup>. — Abducteur de l'index.<br/> <i>z.</i> — Inter-osseux supérieurs ou externes (<i>Métacarpo-sus-phalangiens externes</i>).</p> |
|---|---|

## MYOLOGIE DE L'ORNITHORHYNQUE.

### 6° Muscles du membre postérieur.

- |   |  |
|---|--|
| <p>a. — Grand fessier (<i>Sacro-fémorien</i>).</p> <p>a<sup>1</sup>. — Moyen fessier (<i>Ilio-trochantérien</i>).</p> <p>a<sup>2</sup>. — Petit fessier (<i>Ilii-trochantérien</i>).</p> <p>b. — Carré de la cuisse (<i>Ischio-trochantérien</i>).</p> <p>i. — Iliaque (<i>Ilio-trochantinien</i>).</p> <p>k. — 1<sup>er</sup> Pectiné } (portion du <i>Pubo-fémorien</i>).</p> <p>k<sup>1</sup>. — 2<sup>e</sup> Pectiné }</p> <p>l<sup>1</sup>. — 2<sup>e</sup> ou Moyen adducteur (<i>Sous-pubi-fémorien</i>).</p> <p>l<sup>2</sup>. — 3<sup>e</sup> ou Long adducteur (<i>Ischii-fémorien</i>).</p> <p>n. — Vaste interne (portion du <i>Tri-fémoro-rotulien</i>).</p> <p>p. — Grêle ou Droit antérieur, ou 4<sup>e</sup> Extenseur (<i>Iléo-rotulien</i>).</p> <p>q. — Biceps (<i>Ischio-péronien</i>).</p> <p>r. — Demi-nerveux ou tendineux (<i>Ischio-prétibien</i>).</p> <p>s. — Demi-membraneux (<i>Ischio-sous-tibien</i>).</p> <p>t. — Couturier (<i>Iléo-prétibien</i>).</p> <p>u. — Grêle ou Droit interne (<i>Pubio-prétibien</i>).</p> <p>z. — Gastrocnémien externe (portion du <i>Bi-fémoro-calcanien</i>).</p> | <p>ε. — Soléaire (<i>Tibio-calcanien</i>).</p> <p>δ. — Tibial ou Jambier antérieur (<i>Tibio-sus-tarsien</i>).</p> <p>δ<sup>1</sup>. — — — — — postérieur (<i>Tibio-sous-tarsien</i>).</p> <p>ε. — Long péronier (<i>Péronéo-sous-tarsien</i>).</p> <p>ε<sup>1</sup>. — Moyen péronier (<i>Péronéo-sus-métatarsien</i>).</p> <p>ε<sup>2</sup>. — Court péronier (<i>Péronéi-sus-métatarsien</i>).</p> <p>ζ. — Long extenseur commun (<i>Péronéo-sus-onguien</i>).</p> <p>ζ<sup>1</sup>. — — — — — du pouce (<i>Péronéi-sus-onguien</i>).</p> <p>ζ<sup>2</sup>. — Long extenseur du premier doigt ou index.</p> <p>ι. — Long fléchisseur commun (<i>Tibio-sous-onguien</i>).</p> <p>ι<sup>1</sup>. — — — — — du pouce (<i>Tarso-phalangien</i>).</p> <p>κ. — Court fléchisseur commun (<i>Calcanéo-sous-onguien</i>).</p> <p>λ<sup>2</sup>. — <i>Idem</i> du petit doigt (<i>Tarso-phalangien du petit doigt</i>).</p> <p>ν. — Adducteur oblique du pouce (<i>Métatarso-phalangien du 1<sup>er</sup> orteil</i>).</p> <p>ν<sup>2</sup>. — Adducteurs opposants des 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> doigts.</p> |
|---|--|

### 7° Diverses autres parties.

(Pl. 265, fig. 2; — 269, fig. 1.)

36. — Conduit auditif.

| 2. — Constricteur de l'anus.

AD. FOCILLON.





Fig. 1.  
Squelette vu par sa  
face latérale droite.





Fig. 3.  
Bassin vu de face  
et montrant les os  
marsupiaux.




Fig. 2.  
Appareil sternal,  
vu de face.



Fig. 1.

Face blend  
nose, ear

Fig. 2.

Face latérale de la portion  
antérieure du corps.  
1<sup>re</sup> couche






Fig. 1.

Portion antérieure du corps.  
face latérale droite  
2<sup>e</sup> coupe




Fig. 2.

Face ventrale, régions  
hyoïdienne et sternale.





Fig. 3.

Région sushyoïdienne  
couche profonde.














Fig. 5.

L'extrémité antérieure gauche,  
pour montrer la palmature et la  
disposition des ongles.




Fig. 1.

Squelette du bras  
et de l'avant-bras  
gauches.




Fig. 2.

Membre antérieur droit, côté  
externe du bras et de l'avant-bras  
face palmaire de la main




Fig. 4.

Membre antérieur; face interne de l'épaule.




Fig. 3.

Membre antérieur, face antérieure de  
l'avant-bras et face dorsale de la main



Fig. 1.

Partie postérieure du corps;  
face latérale externe. 1<sup>re</sup> couche.




Fig. 2.

Partie postérieure du corps;  
face latérale externe. 2<sup>e</sup> couche.




Fig. 6.

Extrémité postérieure gauche,  
face dorsale du pied.



Fig. 7.

Muscles du cou; 1<sup>re</sup> couche.




Fig. 8.

Muscles du cou, 2<sup>e</sup> couche.



Fig. 9.

Muscles du cou, 3<sup>e</sup> couche.



Fig. 3.

Membre postérieur;  
face interne. 1<sup>re</sup> couche.




Fig. 4.

Membre postérieur;  
face interne. 2<sup>e</sup> couche.





Fig. 5.

Membre postérieur;  
face interne. 3<sup>e</sup> couche.























3 9088 00448301 2  
origo: KGL531 C99 1950  
v. 3 Anatomie comparée